

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1991/92

Mac/April 1992

FCP 456 Pendispensan Terapeutik

Masa: (3 jam)

Arahan Kepada Pelajar:

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

Perbincangan hendaklah dilakukan dengan doktor bertugas jika ada sebarang masalah tentang rawatan yang diberikan. Sebarang perubahan rawatan yang hendak dilakukan mestilah mendapat persetujuan daripada doktor bertugas.

Pemantauan kes dan kaunseling bagi setiap soalan hendaklah ditulis dengan lengkap di dalam borang laporan yang disediakan.

Soalan 1

Data Asas

Sungutan : gatal kerongkong, nyeri akut di ibu jari kaki.

PE : BP : 150/90 mmHg, PR : 70/min, T : 37.5°C
Makmal : Asid Urik 6.5 mg/dl (0.3 mm/l)
K+ 4.0 mEq/l
Na+ , Cl WNL

PMH : 1. DVT - 5 tahun.
2. HTN - 2 tahun.
3. Gout - 6/12

Rawatan masa lampau :

- 1. Warfarin 1.5 mg QD
- 2. Klorotiazid 500 mg QD
- 3. Amilorid 10 mg QD
- 4. Klondin 0.1 mg BD
- 5. Metildopa 125 mg BD
- 6. Naproksin 250 mg TDS

Wad/Klinik KPP	Jantina L	Umur 65	Nama Mr. Z	No. Pendaftaran 01850	Tarikh 23/2/92
Berat Badan : 45 kg Diagnosis : Trombosis Vena dalaman Hipertensi Gout Jangkitan Saluran Pernafasan atas			Rx 1. Warfarin 1.5 mg QD 2. Klorotiazid 500 mg QD 3. Amilorid 10 mg QD 4. Klondin 0.1 mg bid 5. Naproksin 500 mg TDS 6. Eritromisin 500 mg TDS 7. Benadril 15 ml TDS 8. Timol kumur 100ml		
MO KPP (T/tangan/Cop)			} X 2/12 } X 10/7		
Kaunseling :					

(30 markah)

...3/-

Soalan 2

Nama : En. PS
I/C : A 211101
Jantina : Lelaki
Taraf Kahwin : Kahwin

No. Pendaftaran : 110021
Tarikh Lahir : 21/1/31
Bangsa : Melayu
Tarikh Masuk : 21/2/92

21/2/92

En. PS, 61 tahun seorang lelaki gemuk dimasukkan ke hospital kerana ulser tumit yang bertambah teruk.

HPI : Pesakit berada di dalam keadaan sihat sehingga 2/52 yang lepas apabila mengetahui blister di tumitnya. Blister tersebut tidak memberikan sebarang nyeri sehingga 2/7 yang lepas ia menjadi lebih besar dan dalam dengan lelehan bernanah. Kawasan sekelilingnya menjadi merah dan tender.

PMH : 1. Diabetes jenis II x 30 tahun.
2. Epilepsi x 10 tahun.
3. Arthritis x 8 tahun.

Rawatan :

1. Fenitoin 100 mg p.o. tds x 10 tahun.
2. Gliburid 7.5 mg p.o. q AM x 3 tahun.
3. Aspirin 325 mg tab, 3 tablet qid x 6 tahun
4. Naproksin 250 mg t.d.s x 3 tahun.

Alergi: Penisilin, Sulfa

ROS: Am: Gemuk, bekerjasama, tiada distress.

VS: BP: 130/85 mmHg, HR : 85 min, RR: 18/min,
T:37.9°C, Berat 82 kg.

Dada: Ceria, tiada rale and ronkus.

Abd : Gemuk, buncit, tidak tender.

Ekstrimitis: Ulser merah 3cm pada tumit kaki kiri dengan discas bernanah.

...4/-

Makmal:

Na+:138 mM/l WBC : 8200 / mm^3
K+ :4.8 mM/l RBC : 3.7 x 10⁶ / mm^3
U : 3 mM/l pH : 105,000/ mm^3
Glu:18 mM/l Hgb : 7 g %
Hct : 28 %

Kultur dan sensitiviti ulser : masih menunggu.

- A :
1. Ulser kaki
 2. Diabetes jenis II
 3. Epilepsi
 4. Arthritis Rheumatoid
- P :
1. IV Gentamisin 80 mg t.d.s
 2. IV Ampisilin 500 mg q.i.d
 3. Gliburid 7.5 mg p.o. q AM
 4. Fenitoin 100 mg p.o t.d.s
 5. Aspirin 325 mg tab, 3 tab q.i.d
 6. Naproksin 250 mg t.d.s
 7. MMT 15 ml p.r.n

(35 markah)

Soalan 3

Nama : KY No. Pendaftaran : 21002
I/C : A 000101 Tarikh Lahir : 1/1/35
Jantina : Lelaki Bangsa : Cina
Taraf Kahwin : Kahwin Tarikh Masuk Wad: 20/2 Jam: 11am.

20/2/92

Sejarah Masakini :

Encik KY seorang lelaki berumur 57 tahun dibawa ke hospital mengadu nyeri di bahagian epigastrik semenjak 1 minggu yang lepas serta najis berdarah semenjak 3 hari yang lepas.

...5/-

Sejarah Masalampau :

1. Hipertensi dirawat dengan propranolol 40 mg TDS.
2. Arthritis gout dirawat dengan alopurinol 100 mg TDS dan Naproksin 250 mg TDS.

Sejarah Sosial :

Merokok 1 PPD

Ulangkaji Sistem :

Am : Kulit kelihatan pucat.
PE : BP : 140/90 mmHg, PR : 70/min,
T : 37°C.

Makmal :

Hgb: 10 gm % , SrCr : 2 x normal.

Endoskopi :

Ulser gastrik yang berdarah dengan saiz 2 mm.

Diagnosis : Ulser gastrik berdarah akibat penggunaan agen anti-inflamatori bukan steroid.

Perancangan :

1. Hentikan naproksin
2. Simetidin 200 mg t.d.s dan 400 mg on
3. Tab Gelusil 2 tab prn sakit.
4. Propranolol 40 mg TDS
5. Alopurinol 100 mg TDS
6. Diklofenak 50 mg TDS.

(35 markah)