

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1998/99

Februari 1999

ZCT 104/3 - Fizik IV (Fizik Moden)

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

Di beri:

$$\text{Laju cahaya } c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{Pemalar Planck } h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$\text{Cas elektron } e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{Jisim rehat elektron} = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Pemalar Rydberg} = 1.0974 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

1. (a) Atas suatu gambarajah laju lawan saiz, secara kasar tunjukkan kawasan-kawasan di mana yang berikut dipatuhi: (Juga tunjukkan di mana terletaknya saiz atom, saiz nukleus dan laju cahaya.).

Fizik Klasik

Fizik Kerelatifan

Fizik Kuantum

Fizik Kuantum Kerelatifan.

(10/100)

- (b) Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip kesepadan. (10/100)

- (c) Sebuah kapalangkasa yang amat panjang lalu di hadapan seorang pemerhati yang berada di sebatang tiang yang tertanam di dalam bumi. Mengikut pemerhati bumi laju kapalangkasa itu ialah $0.8c$ dan masa untuk bahagian belakang kapalangkasa laluinya selepas bahagian depan telah lalu ialah $42 \mu\text{s}$. Tentukan yang berikut:

(i) Panjang kapalangkasa mengikut pemerhati bumi.

(ii) Panjang kapalangkasa mengikut pemerhati di dalam kapalangkasa.

...2/-

- (iii) Mengikut pemerhati kapalangkasa selang masa untuk bahagian depan dan bahagian belakang kapal lalui tiang tersebut. (40/100)
- (d) Antena sebuah kapalangkasa berada pada sudut 8° dengan paksi kapal. Jika kapalangkasa itu bergerak dari bumi dengan laju $0.6c$, apakah sudut antena apabila dilihat dari bumi? (40/100)
2. (a) Pada asalnya suatu zarah yang berjisim rehat m_0 bergerak dengan laju $0.4c$
- (i) Jika laju zarah ditingkatkan kepada $0.8c$, apakah momentum barunya berbanding dengan momentum asalnya?
 - (ii) Jika momentum zarah ditingkatkan sehingga momentum akhirnya ialah 10 kali momentum asalnya, apakah laju akhirnya berbanding dengan laju asalnya? (40/100)
- (b) Suatu proton ($E_0 = 0.938$ GeV) dipecut dari keadaan rehat oleh suatu beza keupayaan sebanyak 500 V. Apakah momentumnya? Jika sebaliknya proton dipecut dengan suatu pemecut tenaga tinggi sehingga tenaga kinetiknya ialah 500 GeV, apakah momentumnya sekarang? Berikan jawapan anda dalam unit MeV/c. (40/100)
- (c) Dua buah satelit, setiap mempunyai jisim rehat sebanyak 4000 kg, bergerak pada orbit yang bertentangan dengan laju 8 km/s mengikut pemerhati di bumi. Satelit-satelit itu kemudian berlanggar secara berdepan dan selepas itu melekat bersama. Apakah perubahan jumlah jisim rehat bagi sistem tersebut? (20/100)
3. (a) Apabila cahaya monokromatik yang berjarak gelombang 4046 \AA meninari permukaan sesuatu logam, fotoelektron yang bertenaga tertinggi hanya dapat dihentikan dengan suatu keupayaan pembantut (retarding) sebanyak 1.6 V. Apabila cahaya gelombang yang digunakan bernilai 5769 \AA pula, keupayaan pembantut yang diperlukan ialah 0.45 V. Katakan nilai h dan e tidak diketahui, hitungkan nilai h/e dan fungsi kerja (dalam unit eV) bagi logam tersebut dengan menggunakan data-data yang diberi. (45/100)
- (b) Suatu alur foton monokromatik yang berjarak gelombang 0.620 \AA menghentam suatu sasaran logam. Jika kita mengesan sinaran yang terserak pada sudut 90° dari arah alur menuju, apakah dua jarak gelombang utama yang dikesan? Apakah jarak-jarak gelombang yang dikesan apabila sudut penyerakan ialah 60° . Diberi jarak gelombang Compton bernilai 0.024 \AA . (45/100)

- (c) Dapatkan ketebalan sesuatu bahan penyerap (dalam sebutan pekali penyerapan μ) yang diperlukan untuk mengurangkan keamatan sesuatu alur sinaran ke separuh keamatan asalnya.

(10/100)

4. (a) Tunjukkan bahawa jarak gelombang λ bagi sesuatu zarah yang jisim rehatnya tidak bernilai sifar tetapi jumlah tenaganya E , adalah amat melebihi tenaga rehatnya E_0 , diberi dengan ungkapan

$$\lambda = \frac{0.0124}{E} \text{ MeV}\cdot\text{\AA} \quad (30/100)$$

- (b) Tentukan peratusan ketakpastian momentum bagi suatu 1000 eV elektron jika ketakpastian kedudukannya ialah 1 Å dan bandingkan peratusan ini dengan peratusan ketakpastian momentum bagi sebuah jasad yang berjisim 10 gm dan bergerak dengan laju 10 cm/s. Anggap bahawa bagi jasad ini ketakpastian kedudukannya ialah 1×10^{-3} mm.

(40/100)

- (c) Tunjukkan bahawa laju fasa V_{ph} bagi gelombang yang dikaitkan dengan sesuatu zarah yang mempunyai jisim rehat m_0 dan jarak gelombang λ ialah

$$V_{ph} = c \left[1 + \left(\frac{m_0 c \lambda}{h} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (30/100)$$

5. (a) Zarah-zarah α diserak oleh sekeping kerajang nipis yang bernombor atom z_1 , berketumpatan ρ_1 dan berat atomnya ialah ω_1 . Serakan diperhatikan pada sudut θ . Kerajang itu kemudian digantikan dengan suatu kepingan kedua di mana nilai-nilai tersebut masing-masing ialah z_2 , ρ_2 dan ω_2 . Jisim dan luas kedua-dua kepingan itu adalah sama. Apakah nisbah bilangan zarah yang dikesan pada sudut θ di antara kepingan pertama dan kedua itu?

(35/100)

- (b) Atom-atom hidrogen yang berada di keadaan dasar dihentam dan garis-garis spektrum yang berjarak gelombang sependek garis ketiga series Lyman dipancarkan. Apakah tenaga kinetik minimum yang akan menghasilkan pancaran tersebut sekiranya yang menghentaminya ialah

- (i) foton-foton
(ii) atom-atom hidrogen yang berada di keadaan dasar?

(35/100)

...4/-

- (c) Suatu galaksi didapati sedang menjauhi bumi dengan laju $0.81c$. Hitungkan jarak gelombang garis H_{α} yang dipancarkan oleh atom-atom hidrogen galaksi itu apabila diperhatikan di bumi. Di kawasan spektrum elektromagnet yang manakah garis itu akan terjatuh? Di beri bagi sumber pegun jarak gelombang garis H_{α} ialah 6564.7\AA

(30/100)

- 00000000 -