

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2003/2004

September - Oktober 2003

ZSC 548/4 - Analisis Struktur melalui Kaedah Sinar-X

Masa : 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TIGA** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Nyatakan unsur-unsur simetri yang terdapat di dalam kumpulan titik. Untuk perkembangan kumpulan titik kepada kumpulan ruang, apakah unsur-unsur simetri tambahan yang diperlukan? (30/100)
- (b) Nyatakan takrifan bagi faktor struktur dan berikan rumusannya. Melalui rumusan faktor struktur, terbitkan Hukum Freidel. (30/100)
- (c) Terbitkan ketidak sistematis yang dihasilkan oleh pemusatan muka A. (20/100)
- (d) Berikan secara teliti ketidak sistematis bagi kumpulan ruang yang berikut:-
 - (i) $P_{2_1/c}$
 - (ii) P_{bca} dan
 - (iii) I_{bca}(20/100)

...2/-

2. (a) Berikan perhubungan matematik diantara kekisi resiprokal dan kekisi terus. (20/100)
- (b) Melalui pembinaan Ewald, terbitkan syarat pembelauan membina, $\Delta\vec{k} = \vec{G}$ di mana

$$\Delta\vec{k} = \vec{k}' - \vec{k}$$

dan \vec{k}' = vektor gelombang keluar
 \vec{k} = vektor gelombang datang
 \vec{G} = vektor kekisi resiprokal.

Tunjukkan $\Delta\vec{k} = \vec{G}$ adalah setara dengan Hukum Bragg, iaitu $2dsin\theta = \lambda$. (30/100)

- (b) Bandingkan keuntungan dan kerugian merekodkan kekisi resiprokal dengan kamera Weissenberg, kamera Liukan Buerger dan kamera de-Jong Boumann. (30/100)
- (c) Semasa pengambilan foto Liukan Buerger paras sifar, suatu foto paksi-kon juga diambil. Sinaran yang digunakan adalah Mok _{α} ($\lambda = 0.7173\text{\AA}$). Hablur tunggal adalah diorientasikan dengan paksi-c selari terhadap bim sinar-x mendatang dan sudut condongan kamera ialah 20° .

Data-data foto paksi-kon yang terdapat dijadualkan seperti berikut:-

Paras n	Jejari kon (mm)
0	14.25
1	24.50
2	33.75
3	44.00

Dapatkan nilai pemalar sel c hablur ini. (20/100)

3. (a) Bagi hablur tunggal hakiki iaitu hablur tunggal 3-D

$$\rho(x, y, z) = \frac{1}{V} \sum_{h=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\ell=0}^{\infty} \bar{F}(hkl) e^{-i2\pi(hx+ky+lz)}$$

dan

$$\bar{F}(hkl) = \int_{-\frac{V}{2}}^{\frac{V}{2}} \int_{-\frac{V}{2}}^{\frac{V}{2}} \int_{-\frac{V}{2}}^{\frac{V}{2}} \rho(x, y, z) e^{i2\pi(hx+ky+lz)} dx dy dz$$

di mana simbol-simbol mempunyai erti-erti biasa.

Terangkan prinsip menentukan struktur hablur tunggal dengan menggunakan kedua-dua persamaan di atas.

(50/100)

- (b) Berkaitan penentuan struktur hablur tunggal, jelaskan

- (i) penurunan data, dan
- (ii) penghalusan

(50/100)

4. (a) Terangkan dengan teliti langkah demi langkah bagaimana anda melakukan penentuan struktur melalui kaedah hablur tunggal.

(80/100)

- (b) Bandingkan kaedah terus dengan kaedah atom berat (kaedah Patterson) bagi penentuan struktur hablur tunggal.

(20/100)