

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1991/1992

Oktober/November 1991

BOO 284/4: BIOSTATISTIK

Masa: [3 jam]

Jawab LIMA daripada ENAM soalan.

Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.

.../2

1. Bagi setiap eksperimen yang diuraikan di bawah
 - (i) Nyatakan ujian statistik yang wajar digunakan untuk analisis data yang dihasilkan. Berikan alasan untuk pemilihan anda.
 - (ii) Tuliskan hipotesis nul dan hipotesis alternatif
 - (iii) Berikan formula bagi statistik ujian yang perlu dihitung. Catatkan juga perubahan jenis data, misalnya daripada data metrik kepada data nominal, jika perlu.
 - (iv) Tuliskan dengan ayat yang lengkap kesimpulan ujian statistik itu sekiranya hipotesis nul dapat ditolak.

Terangkan semua simbol yang digunakan.

Eksperimen A

Sejenis cacing planarian, *Dendrocoelum lacteum*, biasanya hidup di habitat yang basah dan gelap.

Eksperimen ini dilakukan untuk mengkaji tindak balas kinesis cacing ini terhadap cahaya, iaitu sama ada ia bergerak dengan lebih giat, membelok-belok, apabila keamatan cahaya meningkat. Cacing itu didedahkan kepada 10 aras keamatan cahaya yang meningkat.

Keamatan cahaya diukur dalam unit lumen/cm²/min.

Kegiatan bergerak cacing itu direkodkan pada skala 1 hingga 10, mengikut tertib naik. Ujian statistik

...3/-

(BOO 284/4)

dilakukan untuk menentukan sama ada keamatan cahaya meningkatkan kinesis cacing itu.

(5 markah)

Eksperimen B

Adalah dijangka bahawa di dalam suatu populasi siput belitong, 75% mempunyai cengkerang dengan corak pusaran mengikut pusingan jam ("clockwise") dan 25% lagi mempunyai cengkerang dengan corak pusaran berlawan pusingan jam ("counterclockwise"). Suatu sampel rawak yang terdiri daripada 100 siput diambil, dan bilangan siput dihitung bagi dua kategori corak pusaran cengkerang. Ujian statistik dilakukan untuk menentukan sama ada data kajian membayangkan jangkaan peratusan untuk populasi siput itu.

(5 markah)

Eksperimen C

Suatu syarikat yang menternak musang untuk menghasilkan bulu menjalankan eksperimen untuk menentukan sama ada penambahan vitamin kepada makanan musang akan meningkatkan kualiti bulu. Sepuluh ekor musang digunakan sebagai kawalan dengan memberi makanan biasa, dan sepuluh ekor lagi diberi makanan yang diperkayakan dengan vitamin. Pada akhir eksperimen, kesemua 20 ekor musang dibunuh dan kulit dengan bulunya diproseskan.

(BOO 284/4)

Seorang pakar dalam penaksiran kualiti bulu diminta meneliti bulu daripada 20 ekor musang itu, tanpa diberitahu bahawa ada perbezaan makanan yang diberi kepada musang-musang semasa hidup. Dia diperlukan menyusun bulu musang dan memberi pangkat kepada setiapnya mengikut kualiti bulu. Bagaimanakah keputusan daripada kajian ini dapat dianalisis untuk menentukan keberkesanan penambahan vitamin dalam meningkatkan kualiti bulu musang?

(5 markah)

Eksperimen D

Untuk menentukan sama ada kevariabelan kandungan Fe di dalam darah manusia adalah lebih tinggi untuk perempuan berbanding dengan lelaki, satu kajian dijalankan untuk menentukan kandungan Fe di dalam darah bagi satu sampel rawak lelaki dewasa yang sihat ($n_1 = 40$) dan bagi satu sampel rawak perempuan dewasa yang sihat ($n_2 = 52$).

(5 markah)

2. (a) Adalah diketahui bahawa tekanan darah sistol bagi populasi lelaki sihat pada umur awal 50an bertaburan normal dengan min sebanyak 135 mm Hg dan sisihan piawai 19 mm Hg. Suatu sampel rawak yang terdiri daripada 25 lelaki dalam lingkungan

(BOO 284/4)

umur yang sama mengikuti rancangan jasmani dan makanan khas yang dianggap akan mengurangkan tekanan darah. Selepas tiga bulan mengikuti rancangan itu, tekanan darah untuk setiap orang diukur, dan min tekanan darah untuk sampel itu didapati ialah 128.2 mm Hg dengan sisihan piawai sebanyak 20 mm Hg. Ujikan sama ada rancangan mengurangkan tekanan darah itu berjaya atau tidak.

(5 markah)

- (b) Kajian di atas diulangi, tetapi untuk tempoh 6 bulan. Huraikan dengan ringkas bagaimana anda akan menjalankan eksperimen ini jika:
- (i) Min dan sisihan piawai populasi tekanan darah lelaki sihat diketahui, dan keputusan daripada kajian tiga bulan diberitahu kepada anda.
 - (ii) Min dan sisihan piawai populasi tekanan darah lelaki sihat tidak diketahui, akan tetapi keputusan daripada kajian tiga bulan diberitahu kepada anda.
 - (iii) Min dan sisihan piawai populasi tekanan darah lelaki sihat tidak diketahui, dan anda tidak mengetahui yang kajian pernah dilakukan bagi tempoh tiga bulan.

Bagi setiap kes di atas, namakan ujian statistik yang anda akan guna untuk analisis data kajian kelak.

(BOE 284/4)

3. Data berikut ialah min kadar memakan (kalori/ m^2 /jam) bagi kanak-kanak mengikut umur dan jantina.

Umur (tahun)	Min kadar memakan (kalori/ m^2 /jam)	
	Lelaki	Perempuan
3	60.1	54.5
4	57.9	53.9
5	56.3	53.0
6	54.2	51.8
7	52.1	50.2
8	50.1	48.4
9	48.2	46.4
10	46.6	44.3
11	45.1	42.4
12	43.8	40.6

Jawab dua daripada tiga soalan berikut. Bagi setiapnya, nyatakan andaian yang berkait dengan kaedah statistik yang anda gunakan.

- (a) Ujikan sama ada terdapat pertalian linear yang bererti di antara kuantiti yang dimakan oleh kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan.

(10 markah)

- (b) Adakah perbezaan kuantiti yang dimakan oleh lelaki dan oleh perempuan bererti?

(10 markah)

- (c) Tentukan secara statistik anggaran min kuantiti yang dimakan oleh kanak-kanak perempuan pada umur lima setengah tahun.

(BOO 284/4)

4. Anda perlu membuat pensampelan pesakit yang diwadkan di Hospital Besar Pulau Pinang untuk menentukan tekanan darah. Hospital Besar itu mempunyai tiga wad utama untuk dewasa, iaitu A, B dan C, dan satu wad untuk kanak-kanak. Pada hari pensampelan terdapat 1050 orang pesakit yang diwadkan yang antaranya ialah 45 orang kanak-kanak. Lima orang pesakit dewasa akan dibedah, dan oleh itu tidak boleh dimasukkan ke dalam sampel anda.

Huraikan bagaimana anda akan lakukan pensampelan untuk kes-kes berikut:

- (a) Anda perlu dapatkan sampel rawak ringkas. Saiz sampel harus sekurang-kurangnya 10% daripada populasi sasaran anda. Penentuan tekanan darah ialah untuk dewasa sahaja.

(5 markah)

- (b) Anda hendak gunakan pensampelan bersistem untuk mendapatkan sampel rawak sebanyak 10% daripada pesakit dewasa.

(5 markah)

- (c) Anda diberitahu bahawa ada 50 orang pesakit dewasa yang menghidapi penyakit tekanan darah tinggi. Anda ingin membuat pensampelan yang membolehkan anda membandingkan tekanan darah antara dewasa yang ada dan tiada tekanan darah darah tinggi, dan juga kanak-kanak.

(5 markah)

(BOO 284/4)

- (d) Di dalam keadaan manakah anda akan gunakan pensampelan kelompok untuk mendapatkan sampel pesakit dewasa? Huraikan juga bagaimana anda akan lakukan pensampelan ini.

(5 markah)

5. Satu kajian dijalankan untuk menentukan penggunaan asetat dalam pembentukan susu oleh kambing di bawah pengaruh enzim. Perlakuan yang dipilih untuk kajian ini ialah:

- (a) Kawalan, K
- (b) Prolaktin pada 0.1 mg/kg berat badan, P
- (c) Deksametason pada 0.1 mg/kg berat badan, D
- (d) Prolaktik dan deksametason pada 0.1 mg/kg berat badan, PD

Enam replikat digunakan untuk setiap perlakuan, tanpa pemblokaran.

Selepas perlakuan diberikan, biopsi dilakukan ke atas kelenjar mamari untuk menentukan aktiviti enzim, yang diukurkan dengan μ mole asetat/jam/g tisu.

Min perlakuan yang didapatkan adalah masing-masing 9.90, 21.07, 18.47 dan 21.76 μ mole asetat/jam/g tisu.
Min kuasa dua ralat ialah 0.1382.

...9/-

(BOO 284/4)

Bandingkan min perlakuan yang dirancangkan seperti berikut:

- (i) kawalan berbanding dengan semua perlakuan lain
- (ii) sinergi enzim, iaitu PD berbanding dengan purata P dan D
- (iii) prolaktin berbanding dengan deksametason

Sebelum menjalankan perbandingan min perlakuan, semak terlebih dahulu sama ada tiga perbandingan terancang di atas berortogon atau tidak. Lakukan perbandingan min dan lapurkan kesimpulan anda.

Bolehkah kajian ini dianalisis sebagai eksperimen faktoran 2×2 ? Jika boleh,uraikan langkah-langkah utama yang anda akan buat, tanpa melakukan perhitungan lanjut. Catatkan maklumat lanjut yang anda perlukan untuk menjalankan analisis statistik untuk eksperimen faktoran.

(20 markah)

6. Satu kajian dilakukan untuk menentukan taburan menegak (vertical distribution) bagi suatu spesies serangga yang hidup di dalam hutan. Empat perangkap diletakkan pada setiap aras, iaitu lantai hutan, lapisan herba, lapisan pokok renik dan kanopi pokok-pokok besar. Selepas dua hari, bilangan serangga bagi

... 10/-

(BOO 284/4)

spesies berkenaan dihitung untuk setiap perangkap, dan data kajian ialah seperti berikut:

Aras	Jumlah aras				
Lantai hutan	40	36	29	23	129
Lapisan herba	140	121	96	82	439
Lapisan pokok renik	84	51	73	66	274
Kanopi pokok besar	69	53	58	41	221

$$\bar{x}.. = 66.4375$$

$$CF = 70623.0625; \quad \sum_{ij} x_{ij}^2 = 86451.0000$$

- (a) Ujikan sama ada perbezaan bilangan serangga dengan aras bererti atau tidak. Jika perlu, lakukan perbandingan min serangga untuk semua pasangan min.

(10 markah)

- (b) Cadangkan perubahan kepada reka bentuk eksperimen bagi kajian ini untuk menentukan juga sama ada jenis perangkap yang berlainan akan memerangkap bilangan serangga yang berbeza. Empat jenis perangkap yang berlainan akan digunakan. Huraikan susun atur perangkap di kawasan kajian di lapangan untuk menentukan serentak:

- (i) Perbezaan bilangan serangga dengan aras tegak di dalam hutan.

...11/-

(BOO 284/4)

(ii) Perbezaan bilangan serangga dengan jenis perangkap

Sekiranya, di dalam jadual di atas, data pada setiap lanjur mewakili bilangan serangga pada setiap jenis perangkap, jalankan analisis statistik untuk mendapatkan kesimpulan untuk (i) dan (ii) tersebut. Perbandingan min secara berpasangan tidak diperlukan.

(10 markah)

...12/-

LAMPIRAN 1

RUMUS PANDUAN

1. Ujian-t bagi sampel tak bersandar

Anggaran varians populasi:

$$i. s_p^2 = \frac{\sum_i (x_{1i} - \bar{x}_1)^2 + \sum_i (x_{2i} - \bar{x}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2} \text{ bagi } n_1 \neq n_2$$

$$ii. s_p^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2}{2} \text{ bagi } n_1 = n_2 = n$$

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2 = s_p^2 \left[\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2} \right]$$

2. Anggaran kecerunan garis regresi linear

$$\hat{b} = \frac{n \sum_i x_i y_i - \sum_i x_i \sum_i y_i}{\sum_i x_i^2 - (\sum_i x_i)^2}$$

3. Anggaran pekali korelasi Pearson

$$r = \frac{n \sum_i x_i y_i - \sum_i x_i \sum_i y_i}{\sqrt{\{n \sum_i x_i^2 - (\sum_i x_i)^2\} \{n \sum_i y_i^2 - (\sum_i y_i)^2\}}}$$

(BOO 284/4)

PERBANDINGAN TERANCANG

Gabungan linear min perlakuan

$$L = \lambda_1 \bar{x}_1 + \lambda_2 \bar{x}_2 + \lambda_3 \bar{x}_3 + \dots + \lambda_k \bar{x}_k; k = \text{bilangan perlakuan}$$

n = bilangan replikat

Ralat piawai untuk L = $\sqrt{\frac{\sum \lambda_i^2}{n}} \text{ (MKD ralat)}$

Statistik ujian untuk L:

$$t = \frac{L}{\text{ralat piawai untuk } L}$$

PERBANDINGAN TAK TERANCANG


(a) LSD (α) = $t_{\alpha, df} \sqrt{\frac{2(\text{MKD ralat})}{n}}$

(b) HSD (α) = $Q_{\alpha, k} \sqrt{\frac{\text{MKD ralat}}{n}}$

14/-

Jadual 2.4: Sifir Keluasan Di Bawah Lengkung Normal Piaawai

Nilai di dalam sifir ialah kadarani di bawah lengkung di antara $z = 0$ dan sesuatu nilai z positif. Keluasan bagi nilai-nilai z negatif boleh didapatkan dengan simetri.



z	Tempat perpuluhan kedua untuk z									
	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2703	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990


From Paul G. Hoel, *Elementary Statistics*, 3rd ed., © 1971, John Wiley and Sons, Inc., New York, p. 287.

LAMPIRAN

Sifir Nilai-Nilai Genting Untuk t

df	Aras keertian untuk ujian satu hujung					
	.10	.05	.025	.01	.005	.0005
	Aras keertian untuk ujian dua hujung					
	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
4	1.533	2.132	2.778	3.747	4.604	8.810
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.866	2.365	2.998	3.499	5.405
8	1.397	1.800	2.308	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.148	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
=	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

* Table B is abridged from Table III of Fisher and Yates: *Statistical tables for biological, agricultural, and medical research*, published by Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh, by permission of the authors and publishers.

TABLE VI CRITICAL POINTS OF THE F DISTRIBUTION5% (Roman Type) and 1% (Boldface Type) Points for the Distribution of F 

Degrees of freedom for denominator (df_1)	Degrees of freedom for numerator (df_2)																						x	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	
1	161 4052	200 4999	216 5403	225 5625	230 5764	234 5859	237 5928	239 5981	241 6022	242 6056	243 6082	244 6106	245 6142	246 6169	248 6208	249 6234	250 6258	251 6286	252 6302	253 6323	253 6334	254 6352	254 6361	254 6366
2	18.51 98.49	19.00 99.01	19.16 99.17	19.25 99.25	19.30 99.30	19.33 99.33	19.36 99.36	19.37 99.38	19.38 99.40	19.40 99.41	19.41 99.42	19.42 99.43	19.43 99.44	19.44 99.45	19.45 99.46	19.46 99.47	19.47 99.48	19.47 99.48	19.48 99.49	19.49 99.49	19.49 99.49	19.49 99.49	19.50 99.50	19.50 99.50
3	10.13 34.12	9.55 30.81	9.28 29.46	9.12 28.71	9.01 28.24	8.94 27.91	8.88 27.67	8.84 27.49	8.81 27.34	8.78 27.23	8.76 27.13	8.74 27.05	8.71 26.92	8.69 26.83	8.66 26.69	8.64 26.50	8.62 26.41	8.60 26.30	8.58 26.27	8.57 26.23	8.56 26.18	8.54 26.12	8.54 26.12	
4	7.71 21.20	6.94 18.00	6.59 16.69	6.39 15.98	6.26 15.52	6.16 15.21	6.09 14.98	6.04 14.80	6.00 14.66	5.96 14.54	5.93 14.45	5.91 14.37	5.87 14.24	5.84 14.15	5.80 14.02	5.77 13.93	5.74 13.83	5.71 13.74	5.70 13.69	5.68 13.61	5.66 13.57	5.65 13.52	5.64 13.46	
5	6.61 16.26	5.79 13.27	5.41 12.06	5.19 11.39	5.05 10.97	4.95 10.67	4.88 10.45	4.82 10.27	4.78 10.15	4.74 10.05	4.70 9.96	4.68 9.89	4.64 9.77	4.60 9.68	4.56 9.55	4.53 9.47	4.50 9.38	4.46 9.29	4.44 9.24	4.42 9.17	4.40 9.13	4.37 9.07	4.36 9.02	
6	5.99 13.74	5.14 10.92	4.76 9.78	4.53 9.15	4.39 8.75	4.28 8.47	4.21 8.26	4.15 8.10	4.10 7.98	4.06 7.87	4.03 7.79	4.00 7.72	3.96 7.60	3.92 7.52	3.87 7.39	3.84 7.31	3.81 7.23	3.77 7.14	3.75 7.09	3.72 7.02	3.71 6.99	3.69 6.94	3.68 6.88	
7	5.59 12.25	4.74 9.95	4.35 8.45	4.12 7.85	3.97 7.46	3.87 7.19	3.79 7.00	3.73 6.84	3.68 6.71	3.63 6.62	3.60 6.54	3.57 6.47	3.52 6.35	3.49 6.27	3.44 6.15	3.41 6.07	3.38 5.98	3.34 5.90	3.32 5.85	3.29 5.78	3.28 5.75	3.25 5.70	3.24 5.67	
8	5.32 11.26	4.46 8.65	4.07 7.59	3.84 7.01	3.69 6.63	3.58 6.37	3.50 6.19	3.44 6.03	3.39 5.91	3.34 5.82	3.31 5.74	3.28 5.67	3.23 5.56	3.20 5.48	3.15 5.36	3.12 5.28	3.08 5.20	3.05 5.11	3.03 5.06	3.00 5.00	2.98 4.96	2.96 4.91	2.94 4.88	
9	5.12 10.56	4.26 8.02	3.86 6.99	3.63 6.42	3.48 6.06	3.37 5.80	3.29 5.62	3.23 5.47	3.18 5.35	3.13 5.26	3.10 5.18	3.07 5.11	3.02 5.00	2.98 4.92	2.93 4.80	2.90 4.73	2.86 4.64	2.82 4.56	2.80 4.51	2.77 4.45	2.76 4.41	2.73 4.36	2.72 4.31	
10	4.96 10.04	4.10 7.56	3.71 6.55	3.48 5.99	3.33 5.64	3.22 5.39	3.14 5.21	3.07 5.06	3.02 4.95	2.97 4.85	2.94 4.78	2.91 4.71	2.86 4.60	2.82 4.52	2.77 4.41	2.74 4.33	2.70 4.25	2.67 4.17	2.64 4.12	2.61 4.05	2.59 4.01	2.56 3.96	2.55 3.93	2.51 3.91
11	4.84 9.65	3.98 7.20	3.59 6.22	3.36 5.67	3.20 5.32	3.09 5.07	3.01 4.88	2.95 4.74	2.90 4.63	2.86 4.54	2.82 4.46	2.79 4.40	2.74 4.29	2.70 4.21	2.65 4.10	2.61 4.02	2.57 3.94	2.53 3.86	2.50 3.80	2.47 3.74	2.45 3.70	2.42 3.66	2.41 3.62	
12	4.75 9.33	3.88 6.93	3.49 5.95	3.26 5.41	3.11 5.06	3.00 4.82	2.92 4.65	2.85 4.50	2.80 4.39	2.76 4.30	2.72 4.22	2.69 4.16	2.64 4.05	2.60 3.98	2.54 3.86	2.50 3.78	2.46 3.70	2.42 3.61	2.40 3.56	2.36 3.49	2.35 3.46	2.32 3.41	2.31 3.38	2.30 3.35
13	4.67 9.07	3.80 6.70	3.41 5.74	3.18 5.20	3.02 4.86	2.92 4.62	2.84 4.44	2.77 4.30	2.72 4.19	2.67 4.10	2.63 4.02	2.60 3.96	2.55 3.85	2.51 3.78	2.46 3.67	2.42 3.51	2.38 3.42	2.34 3.37	2.32 3.37	2.28 3.30	2.26 3.27	2.24 3.21	2.22 3.18	2.21 3.15
14	4.60 8.86	3.74 6.51	3.34 5.96	3.11 5.03	2.96 4.69	2.85 4.46	2.77 4.28	2.70 4.14	2.65 4.03	2.60 3.94	2.56 3.86	2.53 3.80	2.48 3.70	2.44 3.62	2.39 3.51	2.35 3.43	2.31 3.34	2.27 3.26	2.24 3.21	2.21 3.14	2.19 3.11	2.16 3.06	2.14 3.03	2.13 3.03
15	4.54 8.68	3.68 6.36	3.29 5.42	3.06 4.89	2.90 4.56	2.79 4.32	2.70 4.14	2.64 4.00	2.59 3.89	2.55 3.80	2.51 3.73	2.48 3.67	2.43 3.56	2.39 3.48	2.33 3.36	2.29 3.29	2.25 3.20	2.21 3.12	2.21 3.07	2.18 3.00	2.15 2.97	2.12 2.92	2.08 2.89	2.07 2.87
16	4.49 8.53	3.63 6.23	3.24 5.29	3.01 4.77	2.85 4.44	2.74 4.20	2.66 4.03	2.59 3.89	2.54 3.78	2.49 3.69	2.45 3.61	2.42 3.55	2.37 3.45	2.33 3.37	2.28 3.25	2.24 3.18	2.20 3.10	2.16 3.01	2.13 2.96	2.09 2.89	2.07 2.86	2.04 2.80	2.02 2.77	2.01 2.75
17	4.45 8.40	3.59 6.11	3.20 5.18	2.96 4.67	2.81 4.34	2.70 4.10	2.62 3.93	2.55 3.79	2.50 3.68	2.45 3.59	2.41 3.52	2.38 3.45	2.33 3.35	2.29 3.27	2.23 3.16	2.19 3.08	2.15 3.00	2.11 2.92	2.08 2.86	2.04 2.79	2.02 2.76	1.96 2.70	1.92 2.67	1.90 2.65
18	4.41 8.20	3.55 6.01	3.16 5.09	2.93 4.58	2.77 4.25	2.66 4.01	2.58 3.85	2.51 3.71	2.46 3.60	2.41 3.51	2.37 3.44	2.34 3.37	2.29 3.27	2.19 3.19	2.15 3.07	2.11 3.00	2.11 2.91	2.07 2.83	2.04 2.78	2.00 2.71	1.98 2.68	1.95 2.62	1.93 2.59	1.92 2.57
19	4.38 8.18	3.52 5.93	3.13 5.01	2.90 4.50	2.74 4.17	2.63 3.94	2.55 3.77	2.48 3.63	2.43 3.52	2.38 3.43	2.31 3.36	2.26 3.19	2.21 3.12	2.15 3.00	2.11 2.92	2.07 2.84	2.04 2.76	2.00 2.70	1.96 2.63	1.94 2.60	1.91 2.54	1.90 2.51	1.89 2.49	
20	4.35 8.10	3.49 5.85	3.10 4.94	2.87 4.43	2.71 4.10	2.60 3.87	2.52 3.71	2.45 3.56	2.40 3.45	2.35 3.37	2.31 3.30	2.28 3.23	2.23 3.13	2.18 3.05	2.12 2.94	2.08 2.86	2.04 2.77	1.99 2.69	1.96 2.63	1.92 2.56	1.90 2.53	1.87 2.47	1.85 2.44	1.84 2.42
21	4.32 8.02	3.47 5.78	3.07 4.87	2.84 4.37	2.68 4.04	2.57 3.81	2.49 3.65	2.42 3.51	2.37 3.40	2.32 3.31	2.28 3.24	2.25 3.17	2.20 3.07	2.15 2.99	2.09 2.88	2.05 2.80	2.00 2.72	1.96 2.63	1.93 2.58	1.89 2.51	1.87 2.47	1.84 2.42	1.82 2.38	1.81 2.36
22	4.30 7.94	3.44 5.72	3.05 4.82	2.82 4.31	2.66 3.99	2.55 3.76	2.47 3.59	2.40 3.45	2.35 3.37	2.30 3.30	2.26 3.23	2.23 3.13	2.18 3.05	2.13 2.94	2.12 2.83	2.08 2.75	2.04 2.67	1.99 2.58	1.96 2.53	1.92 2.46	1.87 2.42	1.84 2.37	1.81 2.33	1.79 2.31
23	4.28 7.88	3.42 5.66	3.03 4.76	2.80 4.26	2.64 3.94	2.53 3.71	2.45 3.54	2.38 3.41	2.32 3.30	2.28 3.21	2.24 3.14	2.20 3.07	2.14 2.97	2.10 2.89	2.04 2.78	2.00 2.70	1.96 2.62	1.91 2.53	1.88 2.48	1.84 2.41	1.82 2.37	1.79 2.32	1.77 2.28	1.75 2.26

TABLE VI (continued)

Degrees of freedom for denominator (df_2)	Degrees of freedom for numerator (df_1)																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.43	2.36	2.30	2.26	2.22	2.18	2.13	2.09	2.02	1.98	1.91	1.89	1.86	1.82	1.80	1.76	1.74	1.71
	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.25	3.17	3.09	3.03	2.93	2.85	2.74	2.66	2.58	2.49	2.44	2.36	2.33	2.27	2.22	2.21
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.41	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.11	2.06	2.00	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72	1.71
	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.21	3.13	3.05	2.99	2.89	2.81	2.70	2.62	2.54	2.45	2.40	2.32	2.29	2.23	2.19	2.17
26	4.22	3.37	2.89	2.74	2.59	2.47	2.40	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.10	2.05	1.99	1.95	1.90	1.85	1.82	1.78	1.76	1.72	1.70	1.69
	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.17	3.09	3.02	2.96	2.86	2.77	2.66	2.58	2.50	2.41	2.36	2.28	2.21	2.19	2.15	2.13
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.30	2.25	2.20	2.16	2.13	2.08	2.03	1.97	1.93	1.88	1.84	1.80	1.76	1.71	1.68	1.67	1.62
	7.68	5.49	4.60	4.11	3.79	3.56	3.39	3.26	3.14	3.06	2.98	2.93	2.83	2.74	2.63	2.55	2.47	2.38	2.33	2.25	2.21	2.16	2.12	2.10
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.06	2.02	1.96	1.91	1.87	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.67	1.65
	7.64	5.45	4.57	4.07	3.76	3.53	3.36	3.23	3.11	3.03	2.95	2.90	2.80	2.71	2.60	2.52	2.44	2.35	2.30	2.22	2.18	2.13	2.09	2.06
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.05	2.00	1.94	1.90	1.85	1.80	1.77	1.73	1.71	1.68	1.65	1.64
	7.60	5.52	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.08	3.00	2.92	2.87	2.77	2.68	2.57	2.49	2.41	2.32	2.27	2.19	2.15	2.10	2.06	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.34	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.04	1.99	1.93	1.89	1.84	1.79	1.76	1.72	1.69	1.64	1.62	1.60
	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.06	2.98	2.90	2.84	2.74	2.66	2.55	2.47	2.38	2.29	2.24	2.16	2.13	2.07	2.03	2.01
32	4.15	3.30	2.90	2.67	2.51	2.40	2.32	2.25	2.19	2.14	2.10	2.07	2.02	1.97	1.91	1.86	1.82	1.76	1.74	1.69	1.67	1.64	1.61	1.59
	7.50	5.34	4.46	3.97	3.66	3.42	3.25	3.12	3.01	2.94	2.86	2.80	2.70	2.62	2.51	2.42	2.34	2.25	2.20	2.12	2.08	2.02	1.98	1.96
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.30	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.00	1.95	1.89	1.84	1.80	1.74	1.71	1.67	1.64	1.61	1.59	1.57
	7.44	5.29	4.42	3.93	3.61	3.38	3.21	3.08	2.97	2.89	2.82	2.76	2.66	2.58	2.47	2.38	2.30	2.21	2.15	2.08	2.04	1.98	1.94	1.91
36	4.11	3.26	2.86	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.10	2.06	2.03	1.99	1.93	1.87	1.82	1.78	1.72	1.69	1.65	1.62	1.59	1.56	1.55
	7.39	5.25	4.38	3.89	3.58	3.35	3.18	3.04	2.94	2.86	2.78	2.72	2.62	2.54	2.43	2.35	2.26	2.17	2.12	2.04	2.00	1.94	1.90	1.87
38	4.10	3.25	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.96	1.92	1.85	1.80	1.76	1.71	1.67	1.63	1.60	1.57	1.54	1.53
	7.35	5.21	4.34	3.86	3.54	3.32	3.15	3.02	2.91	2.82	2.75	2.69	2.59	2.51	2.40	2.32	2.22	2.14	2.08	2.00	1.97	1.90	1.86	1.84
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.07	2.04	2.00	1.95	1.90	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.61	1.59	1.55	1.53	1.51
	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	3.09	2.99	2.88	2.80	2.73	2.66	2.56	2.49	2.37	2.29	2.20	2.11	2.05	1.97	1.94	1.88	1.84
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.02	1.99	1.94	1.89	1.82	1.78	1.73	1.68	1.64	1.60	1.57	1.54	1.51	1.49
	7.27	5.15	4.29	3.80	3.49	3.26	3.10	2.96	2.86	2.77	2.70	2.64	2.54	2.46	2.35	2.26	2.17	2.08	2.02	1.94	1.91	1.85	1.80	1.78
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.92	1.88	1.81	1.76	1.72	1.66	1.63	1.58	1.56	1.52	1.48	1.48
	7.24	5.12	4.26	3.78	3.46	3.24	3.07	2.94	2.84	2.75	2.68	2.62	2.52	2.44	2.32	2.24	2.15	2.06	2.00	1.92	1.88	1.82	1.78	1.75
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.14	2.09	2.04	2.00	1.97	1.91	1.87	1.80	1.75	1.71	1.65	1.62	1.57	1.54	1.51	1.48	1.46
	7.21	5.10	4.24	3.76	3.44	3.22	3.05	2.92	2.82	2.73	2.66	2.60	2.50	2.42	2.30	2.22	2.13	2.04	1.98	1.90	1.86	1.80	1.76	1.72
48	4.04	3.19	2.80	2.56	2.41	2.30	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.90	1.86	1.79	1.74	1.70	1.64	1.61	1.56	1.51	1.50	1.47	1.45
	7.19	5.08	4.22	3.74	3.42	3.20	3.04	2.90	2.80	2.71	2.64	2.58	2.48	2.40	2.28	2.20	2.11	2.02	1.96	1.88	1.84	1.78	1.73	1.70
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.90	1.85	1.78	1.74	1.69	1.63	1.60	1.55	1.52	1.48	1.46	1.41
	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.18	3.02	2.88	2.78	2.70	2.62	2.56	2.46	2.39	2.26	2.18	2.10	2.00	1.94	1.86	1.82	1.76	1.71	1.63
55	4.02	3.17	2.78	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.97	1.93	1.88	1.83	1.76	1.72	1.67	1.61	1.58	1.52	1.50	1.46	1.41	1.41
	7.12	5.01	4.16	3.68	3.37	3.15	2.98	2.85	2.75	2.66	2.59	2.53	2.43	2.35	2.23	2.15	2.06	1.96	1.90	1.82	1.78	1.71	1.66	1.64
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.86	1.81	1.75	1.70	1.65	1.59	1.56	1.50	1.48	1.44	1.41	1.39
	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.56	2.50	2.40	2.32	2.20	2.12	2.03	1.93	1.87	1.79	1.74	1.68	1.63	1.60
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.94	1.90	1.85	1.80	1.73	1.68	1.63	1.57	1.54	1.49	1.46	1.42	1.39	1.37
	7.04	4.95	4.10	3.62	3.31	3.09	2.93	2.79	2.70	2.61	2.54	2.47	2.37	2.30	2.18	2.09	2.00	1.90	1.84	1.76	1.71	1.64	1.60	1.56
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.22	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.84	1.79	1.72	1.67	1.62	1.56	1.53	1.47	1.45	1.40	1.37	1.35
	7.01	4.92	4.08	3.60	3.29	3.07	2.91	2.77	2.67	2.59	2.51	2.45	2.35	2.28	2.15	2.07	1.98	1.88	1.82	1.74	1.69	1.63	1.56	1.53
80	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.88	1.82	1.77	1.70	1.65	1.60	1.54	1.51	1.45	1.42	1.38	1.35	1.32
	6.96	4.88	4.04	3.56	3.25	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55	2.48	2.41	2.32	2.24	2.11	2.03	1.94	1.84	1.78	1.70	1.65	1.57	1.52	1.49
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.76	1.71	1.64	1.59	1.54	1.47	1.44	1.41	1.39	1.36	1.33
	6.90	4.82	3.98	3.51	3.20	2.99	2.82	2.69	2.59	2.51	2.43	2.36	2.26	2.19	2.06	1.98	1.89	1.79	1.73	1.64	1.59	1.53	1.46	1.43
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.77	1.72	1.65	1.60	1.55	1.49	1.45	1.39	1.36	1.31	1.27	1.25
	6.84	4.78	3.94	3.47	3.17	2.95	2.79	2.65	2.56	2.47	2.40	2.33	2.23	2.15	2									

TABLE A 15
UPPER 5% PERCENTAGE POINTS, Q , IN THE STUDENTIZED RANGE*


Degrees of Freedom, f	Number of Treatments, a																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	18.0	27.0	32.8	37.2	40.5	43.1	45.4	47.3	49.1	50.6	51.9	53.2	54.3	55.4	56.3	57.2	58.0	58.8
2	6.09	8.33	9.80	10.89	11.73	12.43	13.03	13.54	13.99	14.39	14.75	15.08	15.38	15.65	15.91	16.14	16.46	16.77
3	4.50	5.91	6.83	7.51	8.04	8.47	8.85	9.18	9.46	9.72	9.95	10.16	10.35	10.52	10.69	10.84	11.02	11.21
4	3.93	5.04	5.76	6.29	6.71	7.06	7.35	7.60	7.83	8.03	8.21	8.37	8.52	8.67	8.80	8.92	9.03	9.14
5	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	7.32	7.47	7.60	7.72	7.83	7.93	8.03	8.12
6	3.46	4.34	4.90	5.31	5.63	5.89	6.12	6.32	6.49	6.65	6.79	6.92	7.04	7.14	7.24	7.34	7.43	7.51
7	3.34	4.16	4.68	5.06	5.35	5.59	5.80	5.99	6.15	6.29	6.42	6.54	6.65	6.75	6.84	6.93	7.01	7.08
8	3.26	4.04	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.05	6.18	6.29	6.39	6.48	6.57	6.65	6.73	6.80
9	3.20	3.95	4.42	4.76	5.02	5.24	5.43	5.60	5.74	5.87	5.98	6.09	6.19	6.28	6.36	6.44	6.51	6.58
10	3.15	3.88	4.33	4.66	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83	5.93	6.03	6.12	6.20	6.27	6.34	6.41
11	3.11	3.82	4.26	4.58	4.82	5.03	5.20	5.35	5.49	5.61	5.71	5.81	5.90	5.98	6.06	6.14	6.20	6.27
12	3.08	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.40	5.51	5.61	5.71	5.80	5.88	5.95	6.02	6.09	6.15
13	3.06	3.73	4.15	4.46	4.69	4.88	5.05	5.19	5.32	5.43	5.53	5.63	5.71	5.79	5.86	5.93	6.00	6.06
14	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.36	5.46	5.56	5.64	5.72	5.79	5.86	5.92	6.03
15	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	5.40	5.49	5.57	5.65	5.72	5.79	5.85	5.91
16	3.00	3.65	4.05	4.34	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.26	5.35	5.44	5.52	5.59	5.66	5.73	5.79	5.84
17	2.98	3.62	4.02	4.31	4.52	4.70	4.86	4.99	5.11	5.21	5.31	5.39	5.47	5.55	5.61	5.68	5.74	5.79
18	2.97	3.61	4.00	4.28	4.49	4.67	4.83	4.96	5.07	5.17	5.27	5.35	5.43	5.50	5.57	5.63	5.69	5.74
19	2.96	3.59	3.98	4.26	4.47	4.64	4.79	4.92	5.04	5.14	5.23	5.32	5.39	5.46	5.53	5.59	5.65	5.73
20	2.95	3.58	3.96	4.24	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20	5.28	5.36	5.43	5.50	5.56	5.61	5.66
24	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37	4.54	4.68	4.81	4.92	5.01	5.10	5.18	5.25	5.32	5.38	5.44	5.50	5.55
30	2.89	3.48	3.84	4.11	4.30	4.46	4.60	4.72	4.83	4.92	5.00	5.08	5.15	5.21	5.27	5.33	5.38	5.43
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.74	4.82	4.90	4.98	5.05	5.11	5.17	5.22	5.27	5.32
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.65	4.73	4.81	4.88	4.94	5.00	5.06	5.11	5.15	5.20
120	2.80	3.36	3.69	3.92	4.10	4.24	4.36	4.47	4.56	4.64	4.71	4.78	4.84	4.90	4.95	5.00	5.04	5.13
α	2.77	3.32	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	4.62	4.68	4.74	4.80	4.84	4.89	4.93	4.97

* Reprinted from *Biometrika*, 39:192 (1952) by permission of the author, Joyce M. May, and the editor.

(BOO 284/4)

TABLE VII CRITICAL VALUES OF r FOR TESTING $\rho = 0$

For a two-sided test α is twice the value listed at the heading of a column of critical r values; hence for $\alpha = 0.05$ choose the 0.025 column.



$n \backslash \alpha$	0.05	0.025	0.010	0.005
5	0.805	0.878	0.934	0.959
6	0.729	0.811	0.882	0.917
7	0.669	0.754	0.833	0.875
8	0.621	0.707	0.789	0.834
9	0.582	0.666	0.750	0.798
10	0.549	0.632	0.716	0.765
11	0.521	0.602	0.685	0.735
12	0.497	0.576	0.658	0.708
13	0.476	0.553	0.634	0.684
14	0.457	0.532	0.612	0.661
15	0.441	0.514	0.592	0.641
16	0.426	0.497	0.574	0.623

$n \backslash \alpha$	0.05	0.025	0.010	0.005
17	0.412	0.482	0.558	0.606
18	0.400	0.468	0.542	0.590
19	0.389	0.456	0.528	0.575
20	0.378	0.444	0.516	0.561
25	0.337	0.396	0.462	0.505
30	0.306	0.361	0.423	0.463
40	0.264	0.312	0.366	0.402
50	0.235	0.279	0.328	0.361
60	0.214	0.254	0.300	0.330
80	0.185	0.220	0.260	0.286
100	0.165	0.196	0.232	0.256

Tables VI and VII are from Paul G. Hoel, *Elementary Statistics*, 3rd ed., © 1971, John Wiley and Sons, Inc., New York, pp. 289, 292-294.

-0000000-