

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1988/89

FMT 202 Statistik

Tarikh: 30 Oktober 1988

Masa: 9.00 pagi - 11.00 pagi
(2 jam)

Kertas ini mengandungi ENAM soalan.

Jawab LIMA (5) soalan sahaja.

Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (A) Sebuah kotak mengandungi 12 biji tablet A, 6 biji tablet B dan 2 biji tablet C. Dua biji tablet dikeluarkan dari kotak tanpa pengembalian. Untuk setiap biji tablet A, anda bayar seringggit; tablet B dua ringgit dan tablet C enam ringgit. Katakan pembolehubah rawak X ialah jumlah wang yang anda bayar, carikan nilai-nilai X dan kebarangkalian masing-masingnya.

(10 markah)

- (B) Sebuah kelab Farmasi mempunyai 10 orang lelaki dan 20 orang perempuan. Sekiranya sebuah jawatankuasa kecil (4 orang) didirikan, berapakah cara boleh dihasilkan jika

- (i) jawatankuasa kecil itu terdiri daripada 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan?
- (ii) sekurang-kurangnya seorang ahli jawatankuasa itu ialah seorang lelaki?
- (iii) bilangan orang wanita melebihi orang lelaki dalam jawatankuasa itu?

(10 markah)

2. Jadual yang berikut menunjukkan kepekatan pencemar (mg) di dalam 25 sampel

0.01	0.05	0.03	0.04	0.05
0.05	0.02	0.07	0.05	0.03
0.03	0.07	0.02	0.07	0.04
0.01	0.10	0.01	0.06	0.05
0.02	0.06	0.04	0.01	0.02

- (A) Kirakan min (mean) dan sisihan piawai untuk kepekatan pencemar dengan menggunakan transformasi linear.
- (B) Kirakan median untuk kepekatan pencemar tersebut.

(20 markah)

3. Satu keputusan kajian universiti tempatan tentang penggunaan tali keledar dan kemalangan kenderaan disenaraikan.

		<u>Cedera Parah</u>	
		Ya	Tidak
<u>Pakai tali keledar</u>	Ya	7	89
	Tidak	21	121

- (A) Ujikan keputusan tersebut di peringkat kesignifikanan 90% berasaskan (H_0 : Memakai tali keledar tidak menyelamatkan nyawa).

(10 markah)

(B) Adakah H_0 masih sah pada peringkat kesignifikanan 99.5%?

(6 markah)

(C) Berpandu kepada jawapan (B), peringkat kesignifikanan yang manakah yang anda akan pilih? Terangkan asas pemilihan anda.

(4 markah)

4. Anda dikehendaki mentafsirkan keputusan rawatan berikut.

	Digoksin	Milrinon	Trianon
n	38	14	27
Paras darah (purata)	1.3 mg/L	13.5 mg/L	1.9 mg/L
Penguncupan Jantung (purata)	80 minit ⁻¹	100 minit ⁻¹	69 minit ⁻¹
S	16	11	30

(A) Adakah paras darah drug digoksin dan milrinon lebih berkesan jika dibandingkan dengan populasi yang mempunyai nilai $\mu = 10.5$ mg/L dan $\sigma = 2$ mg/L? Gunakan peringkat kesignifikanan 99%.

(10 markah)

- (B) Tentukan sempadan keyakinan untuk penguncupan jantung akibat tindakan trianon pada peringkat 95%.

(5 markah)

- (C) Apakah nilai paras darah digoksin yang patut diperolehi di peringkat kesignifikanan 95%?

(5 markah)

5. (A) Apakah perbezaan antara ujian-ujian statistik parametrik dan bukan parametrik.

(4 markah)

- (B) Satu kajian dijalankan untuk membanding kadar penyerapan sesuatu drug dari dua formulasi X dan Y. Masa yang diambil untuk mencapai paras maksima dalam plasma digunakan sebagai sukatan kadar penyerapan. Sepuluh subjek manusia dipilih dan dibahagikan secara rawak kepada dua kumpulan di mana satu kumpulan diberi formulasi X dan yang lain diberikan Y. Data berikut diperolehi.

Masa (minit) untuk mencapai paras maksima

<u>Formulasi X</u>	<u>Formulasi Y</u>
19.8	20.5
23.5	20.1
18.0	15.5
21.0	14.1
26.0	15.2

(a) Pilih satu ujian statistik parametrik yang sesuai untuk menentukan sama ada terdapat sebarang perbezaan yang signifikan antara dua formulasi ini.

(8 markah)

(b) Pilih satu ujian statistik bukan parametrik yang sesuai untuk menentukan sama ada terdapat sebarang perbezaan yang signifikan antara dua formulasi ini.

(8 markah)

6. Untuk menjimatkan wang, ahli-ahli farmasi telah mengguna drug-drug generik untuk mengganti drug jenama. Lapan ahli farmasi dipilih secara rawak dan berikut adalah penjimatan kos mereka bagi tahun 1984-1987.

Penjimatan (sen/preskripsi) bagi tahun 1984-1987

<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>
3	4	7	7
6	5	8	8
3	4	7	9
3	3	6	8
1	2	5	10
2	3	6	10
2	4	5	9
2	3	6	11

- (A) Bandingkan penjimatan wang ini dan pilih satu ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada perbezaan bagi tahun 1984-1987 signifikan atau tidak.

(14 markah)

- (B) Beri alasan-alasan mengapa anda memilih ujian statistik tersebut.

(6 markah)

FORMULA

$$1. \text{ Median } (m) = b + c \times \frac{d}{f}$$

$$2. u_i = Ax_i + B$$

$$3. \bar{x} = \frac{1}{A} (\bar{u} - B)$$

$$4. S_x^2 = \frac{1}{A^2} S_u^2$$

$$5. S_u^2 = \frac{\sum u_i^2 f_i - n\bar{u}^2}{n - 1}$$

$$6. \text{ Trimean} = \frac{\text{kuartil atas} + (2 \times \text{median}) + \text{kuartil bawah}}{4}$$

7. Ujian-t

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n - 1}}$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$$

$$s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$t = \frac{\bar{D}}{S/\sqrt{n}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n}}{n - 1}}$$

8. Ujian Wilcoxon (independent samples)

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - \Sigma R$$

$$U' = n_1 n_2 - U$$

9. Ujian Sign

$$P(s \geq k) = 1 - P(s \geq k-1)$$

10. ANOVA (1-way)

$$SS_{\text{Total}} = \Sigma X^2 - \frac{(\Sigma X)^2}{n_T}$$

$$SS_{\text{Treatments}} = \frac{(\Sigma X_A)^2}{n_A} + \frac{(\Sigma X_B)^2}{n_B} + \dots - \frac{(\Sigma X)^2}{n_T}$$

$$SS_{\text{Error}} = SS_{\text{Total}} - SS_{\text{Treatments}}$$

$$\text{d.f. (Total)} = (n_T - 1)$$

$$\text{d.f. (Treatment)} = (k - 1)$$

$$\text{d.f. (Error)} = (n_1 + n_2 + \dots + n_k - k)$$

$$HSD = \frac{q\sqrt{MS_{\text{error}}}}{\sqrt{n}}$$

$$n_{nm} = \frac{2 n_1 n_2}{n_1 + n_2}$$

11. Ujian Kruskal-Wallis

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \left(\frac{R_1^2}{n_1} + \frac{R_2^2}{n_2} + \dots + \frac{R_k^2}{n_k} \right) - 3(N+1)$$

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

$$\text{d.f.} = k - 1$$

Ujian perbandingan berganda:

$$\Delta \bar{R} = Z_{(\alpha/k (k-1))} \sqrt{\frac{N(N+1)}{12} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

12. Ujian Friedman

$$Q = \frac{12}{n_k(k+1)} (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_k^2) - 3n(k+1)$$

$$\text{d.f.} = k - 1$$

Ujian perbandingan berganda:

$$\Delta R = Z_{(\alpha/k (k-1))} \sqrt{\frac{b k (K+1)}{6}}$$

13. Formula Sturges

$$k = 1 + 3.3 \log_{10} n$$

14. Ujian Korelasi

$$R = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{\sqrt{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \sqrt{n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2}}$$

15. Analisis Regresi

$$y = mx + c$$

$$m = \frac{\Sigma xy - \frac{\Sigma x \Sigma y}{n}}{\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}}$$

$$c = \frac{\Sigma y - m(\Sigma x)}{n}$$

$$SS_E = \Sigma y^2 - m \Sigma xy - \frac{(\Sigma y)^2}{n} + \frac{m \Sigma x \Sigma y}{n}$$

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{SS_E}{n-2}}$$

$$16. \chi^2 = \frac{N(AD - BC)^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

TABLE IV Normal curve areas

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990
3.1	.49903									
3.2	.49931									
3.3	.49952									
3.4	.49966									
3.5	.49977									
3.6	.49984									
3.7	.49989									
3.8	.49993									
3.9	.49995									
4.0	.50000									

TABLE V Chi square

Column headings indicate probability of chance
deviation between O and E.

D.F. \ P	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1.	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2.	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3.	4.108	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4.	5.385	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5.	6.626	9.236	11.071	12.833	15.086	16.750
6.	7.841	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7.	9.037	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8.	10.219	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9.	11.389	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10.	12.549	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11.	13.701	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12.	14.845	18.549	21.026	23.337	26.217	28.299
13.	15.984	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14.	17.117	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15.	18.245	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801

Adapted from table of χ^2 appearing in *Handbook of Statistical Tables* by D. B. Owen, Addison-Wesley, 1962, p. 50. Reprinted by permission of the U.S. Atomic Energy Commission.

TABLE VII Critical Values of F

[FMT 202]

The obtained F is significant at a given level if it is equal to or greater than the value shown in the table. 0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of F

		Degrees of freedom for greater mean square																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	=
Degrees of freedom for lesser mean square	1	161 4052	200 4999	216 5403	225 5625	230 5764	234 5859	237 5928	239 5981	241 6022	242 6056	243 6082	244 6106	245 6142	246 6169	248 6208	249 6234	250 6258	251 6286	252 6302	253 6323	253 6334	254 6352	254 6361	254 6366
	2	18.51 98.49	19.00 99.01	19.16 99.17	19.25 99.25	19.30 99.30	19.33 99.33	19.36 99.34	19.37 99.36	19.38 99.38	19.39 99.40	19.40 99.41	19.41 99.42	19.42 99.43	19.43 99.44	19.44 99.45	19.45 99.46	19.46 99.47	19.47 99.48	19.47 99.48	19.48 99.49	19.49 99.49	19.49 99.49	19.50 99.50	19.50 99.50
	3	10.13 34.12	9.55 30.81	9.28 29.46	9.12 28.71	9.01 28.24	8.94 27.91	8.88 27.67	8.84 27.49	8.81 27.34	8.78 27.23	8.76 27.13	8.74 27.05	8.71 26.92	8.69 26.83	8.66 26.69	8.64 26.60	8.62 26.50	8.60 26.41	8.58 26.30	8.57 26.27	8.56 26.23	8.54 26.18	8.54 26.14	8.53 26.12
	4	7.71 21.20	6.94 18.00	6.59 16.69	6.39 15.98	6.26 15.52	6.16 15.21	6.09 14.98	6.04 14.80	6.00 14.66	5.96 14.54	5.93 14.45	5.91 14.37	5.87 14.24	5.84 14.15	5.80 14.02	5.77 13.93	5.74 13.83	5.71 13.74	5.70 13.69	5.68 13.61	5.66 13.57	5.65 13.52	5.64 13.48	5.63 13.46
	5	6.61 16.26	5.79 13.27	5.41 12.06	5.19 11.39	5.05 10.97	4.95 10.67	4.88 10.45	4.82 10.27	4.78 10.15	4.74 10.05	4.70 9.96	4.68 9.89	4.64 9.77	4.60 9.68	4.56 9.55	4.53 9.47	4.50 9.38	4.46 9.29	4.44 9.24	4.42 9.17	4.40 9.13	4.38 9.07	4.37 9.04	4.36 9.02
	6	5.99 13.74	5.14 10.92	4.76 9.78	4.53 9.15	4.39 8.75	4.28 8.47	4.21 8.26	4.15 8.10	4.10 7.98	4.06 7.87	4.03 7.79	4.00 7.72	3.96 7.60	3.92 7.52	3.87 7.39	3.84 7.31	3.81 7.23	3.77 7.14	3.75 7.09	3.72 7.02	3.71 6.99	3.69 6.94	3.68 6.90	3.67 6.88
	7	5.59 12.25	4.74 9.55	4.35 8.45	4.12 7.85	3.97 7.46	3.87 7.19	3.79 7.00	3.73 6.84	3.68 6.71	3.63 6.62	3.60 6.54	3.57 6.47	3.52 6.35	3.49 6.27	3.44 6.15	3.41 6.07	3.38 5.98	3.34 5.90	3.32 5.85	3.29 5.78	3.28 5.75	3.25 5.70	3.24 5.67	3.23 5.65
	8	5.32 11.26	4.46 8.65	4.07 7.59	3.84 7.01	3.69 6.63	3.58 6.37	3.50 6.19	3.44 6.03	3.39 5.91	3.34 5.82	3.31 5.74	3.28 5.67	3.23 5.56	3.20 5.48	3.15 5.36	3.12 5.28	3.08 5.20	3.05 5.11	3.03 5.06	3.00 5.00	2.98 4.96	2.96 4.91	2.94 4.88	2.93 4.86
	9	5.12 10.56	4.26 8.02	3.86 6.99	3.63 6.42	3.48 6.06	3.37 5.80	3.29 5.62	3.23 5.47	3.18 5.35	3.13 5.26	3.10 5.18	3.07 5.11	3.02 5.00	2.98 4.92	2.93 4.80	2.90 4.73	2.86 4.64	2.82 4.56	2.80 4.51	2.77 4.45	2.76 4.41	2.73 4.36	2.72 4.33	2.71 4.31
	10	4.96 10.04	4.10 7.56	3.71 6.55	3.48 5.99	3.33 5.64	3.22 5.39	3.14 5.21	3.07 5.06	3.02 4.95	2.97 4.85	2.94 4.78	2.91 4.71	2.86 4.60	2.82 4.52	2.77 4.41	2.74 4.33	2.70 4.25	2.67 4.17	2.64 4.12	2.61 4.05	2.59 4.01	2.56 3.96	2.55 3.93	2.54 3.91
	11	4.84 9.65	3.98 7.20	3.59 6.22	3.36 5.67	3.20 5.32	3.09 5.07	3.01 4.88	2.95 4.74	2.90 4.63	2.86 4.54	2.82 4.46	2.79 4.40	2.74 4.29	2.70 4.21	2.65 4.10	2.61 4.02	2.57 3.94	2.53 3.86	2.50 3.80	2.47 3.74	2.45 3.70	2.42 3.64	2.41 3.62	2.40 3.60
	12	4.75 9.33	3.88 6.93	3.49 5.95	3.26 5.41	3.11 5.06	3.00 4.82	2.92 4.65	2.85 4.50	2.80 4.39	2.76 4.30	2.72 4.22	2.69 4.16	2.64 4.05	2.60 3.98	2.54 3.86	2.50 3.78	2.46 3.70	2.42 3.62	2.40 3.56	2.36 3.49	2.35 3.46	2.32 3.41	2.31 3.38	2.30 3.36
	13	4.67 9.07	3.80 6.70	3.41 5.74	3.18 5.20	3.02 4.86	2.92 4.62	2.84 4.44	2.77 4.30	2.72 4.19	2.67 4.10	2.63 4.02	2.60 3.96	2.55 3.85	2.51 3.78	2.46 3.67	2.42 3.59	2.38 3.51	2.34 3.42	2.32 3.37	2.28 3.30	2.26 3.27	2.24 3.21	2.22 3.18	2.21 3.16
	14	4.60 8.86	3.74 6.51	3.34 5.56	3.11 5.03	2.96 4.69	2.85 4.46	2.77 4.28	2.70 4.14	2.65 4.03	2.60 3.94	2.56 3.86	2.53 3.80	2.48 3.70	2.44 3.62	2.39 3.51	2.35 3.43	2.31 3.34	2.27 3.26	2.24 3.21	2.21 3.14	2.19 3.11	2.16 3.06	2.14 3.02	2.13 3.00
	15	4.54 8.68	3.68 6.36	3.29 5.42	3.06 4.89	2.90 4.56	2.79 4.32	2.70 4.14	2.64 4.00	2.59 3.89	2.55 3.80	2.51 3.73	2.48 3.67	2.43 3.56	2.39 3.48	2.33 3.36	2.29 3.29	2.25 3.20	2.21 3.12	2.18 3.07	2.15 3.00	2.12 2.97	2.10 2.92	2.08 2.89	2.07 2.87

A-10

TABLE VII (continued)

0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of F

		Degrees of freedom for greater mean square																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	=
Degrees of freedom for lesser mean square	16	4.49 8.53	3.63 6.23	3.24 5.29	3.01 4.77	2.85 4.44	2.74 4.20	2.66 4.03	2.59 3.89	2.54 3.78	2.49 3.69	2.45 3.61	2.42 3.55	2.37 3.45	2.33 3.37	2.28 3.25	2.24 3.18	2.20 3.10	2.16 3.01	2.13 2.96	2.09 2.89	2.07 2.86	2.04 2.80	2.02 2.77	2.01 2.75
	17	4.45 8.40	3.59 6.11	3.20 5.18	2.96 4.67	2.81 4.34	2.70 4.10	2.62 3.93	2.55 3.79	2.50 3.68	2.45 3.59	2.41 3.52	2.38 3.45	2.33 3.35	2.29 3.27	2.23 3.16	2.19 3.08	2.15 3.00	2.11 2.92	2.08 2.86	2.04 2.79	2.02 2.76	1.99 2.70	1.97 2.67	1.96 2.65
	18	4.41 8.28	3.55 6.01	3.16 5.09	2.93 4.58	2.77 4.25	2.66 4.01	2.58 3.85	2.51 3.71	2.46 3.60	2.41 3.51	2.37 3.44	2.34 3.37	2.29 3.27	2.25 3.19	2.19 3.07	2.15 2.99	2.11 2.91	2.07 2.83	2.04 2.78	2.00 2.71	1.98 2.68	1.95 2.62	1.93 2.59	1.92 2.57
	19	4.38 8.18	3.52 5.93	3.13 5.01	2.90 4.50	2.74 4.17	2.63 3.94	2.55 3.77	2.48 3.63	2.43 3.52	2.38 3.43	2.34 3.36	2.31 3.30	2.26 3.19	2.21 3.12	2.15 3.00	2.11 2.92	2.07 2.84	2.02 2.76	2.00 2.70	1.96 2.63	1.94 2.60	1.91 2.54	1.90 2.51	1.88 2.49
	20	4.35 8.10	3.49 5.85	3.10 4.94	2.87 4.43	2.71 4.10	2.60 3.87	2.52 3.71	2.45 3.56	2.40 3.45	2.35 3.37	2.31 3.30	2.28 3.23	2.23 3.13	2.18 3.05	2.12 2.94	2.08 2.86	2.04 2.77	1.99 2.69	1.96 2.63	1.92 2.56	1.90 2.53	1.87 2.47	1.85 2.44	1.84 2.42
	21	4.32 8.02	3.47 5.78	3.07 4.87	2.84 4.34	2.68 4.08	2.57 3.81	2.49 3.65	2.42 3.51	2.37 3.40	2.32 3.31	2.28 3.24	2.25 3.17	2.20 3.07	2.15 2.99	2.09 2.88	2.05 2.80	2.00 2.72	1.96 2.63	1.93 2.58	1.89 2.53	1.87 2.48	1.84 2.41	1.82 2.37	1.81 2.34
	22	4.30 7.94	3.44 5.72	3.05 4.82	2.82 4.31	2.66 3.99	2.55 3.76	2.47 3.59	2.40 3.45	2.35 3.35	2.30 3.26	2.26 3.18	2.23 3.12	2.18 3.02	2.13 2.94	2.07 2.83	2.03 2.75	1.98 2.67	1.93 2.58	1.91 2.53	1.87 2.48	1.84 2.41	1.81 2.37	1.80 2.34	1.78 2.31
	23	4.28 7.88	3.42 5.66	3.03 4.76	2.80 4.26	2.64 3.94	2.53 3.71	2.45 3.54	2.38 3.41	2.32 3.30	2.28 3.21	2.24 3.14	2.20 3.07	2.14 2.97	2.10 2.89	2.04 2.78	2.00 2.70	1.96 2.62	1.91 2.53	1.88 2.48	1.84 2.41	1.82 2.37	1.79 2.32	1.77 2.28	1.76 2.26
	24	4.26 7.82	3.40 5.61	3.01 4.72	2.78 4.22	2.62 3.90	2.51 3.67	2.43 3.50	2.36 3.36	2.30 3.25	2.26 3.17	2.22 3.09	2.18 3.03	2.13 2.93	2.09 2.85	2.02 2.74	1.98 2.66	1.94 2.58	1.89 2.49	1.86 2.44	1.82 2.36	1.80 2.33	1.76 2.27	1.74 2.23	1.73 2.21
	25	4.24 7.77	3.38 5.57	2.99 4.68	2.76 4.18	2.60 3.86	2.49 3.63	2.41 3.46	2.34 3.32	2.28 3.21	2.24 3.13	2.20 3.05	2.16 2.99	2.11 2.89	2.06 2.81	2.00 2.70	1.96 2.62	1.92 2.54	1.87 2.45	1.84 2.40	1.80 2.32	1.77 2.29	1.74 2.23	1.72 2.19	1.71 2.17
	26	4.22 7.72	3.37 5.53	2.89 4.64	2.74 4.14	2.59 3.82	2.47 3.59	2.39 3.42	2.32 3.29	2.27 3.17	2.22 3.09	2.18 3.02	2.15 2.96	2.10 2.86	2.05 2.77	1.99 2.66	1.95 2.58	1.90 2.50	1.85 2.41	1.82 2.36	1.78 2.28	1.76 2.25	1.72 2.19	1.70 2.15	1.69 2.13
	27	4.21 7.68	3.35 5.49	2.96 4.60	2.73 4.11	2.57 3.79	2.46 3.56	2.37 3.39	2.30 3.26	2.25 3.14	2.20 3.06	2.16 2.98	2.13 2.93	2.08 2.88	2.03 2.74	1.97 2.63	1.93 2.55	1.88 2.47	1.84 2.38	1.80 2.33	1.76 2.25	1.74 2.21	1.71 2.16	1.68 2.12	1.67 2.10
	28	4.20 7.64	3.34 5.45	2.95 4.57	2.71 4.07	2.56 3.76	2.44 3.53	2.36 3.36	2.29 3.23	2.24 3.11	2.19 3.03	2.15 2.95	2.12 2.90	2.06 2.80	2.02 2.71	1.96 2.60	1.91 2.52	1.87 2.44	1.81 2.35	1.78 2.30	1.75 2.22	1.72 2.18	1.69 2.13	1.67 2.09	1.65 2.06
	29	4.18 7.60	3.33 5.52	2.93 4.54	2.70 4.04	2.54 3.73	2.43 3.50	2.35 3.32	2.28 3.20	2.22 3.08	2.18 3.00	2.14 2.92	2.10 2.87	2.05 2.77	2.00 2.68	1.94 2.57	1.90 2.49	1.85 2.41	1.80 2.32	1.77 2.27	1.73 2.19	1.71 2.15	1.68 2.10	1.65 2.06	1.64 2.03
	30	4.17 7.56	3.32 5.39	2.92 4.51	2.69 4.02	2.53 3.70	2.42 3.47	2.34 3.30	2.27 3.17	2.21 3.06	2.16 2.98	2.12 2.90	2.09 2.84	2.04 2.74	1.99 2.66	1.93 2.55	1.89 2.47	1.84 2.38	1.79 2.29	1.76 2.24	1.72 2.16	1.69 2.13	1.66 2.07	1.64 2.03	1.62 2.01

TABLE VII (continued)

[FMT 202]

0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of F

		Degrees of freedom for greater mean square																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	∞
Degrees of freedom for lesser mean square	32	4.15 7.50	3.30 5.34	2.90 4.46	2.67 3.97	2.51 3.66	2.40 3.42	2.32 3.25	2.25 3.12	2.19 3.01	2.14 2.94	2.10 2.86	2.07 2.80	2.02 2.70	1.97 2.62	1.91 2.51	1.86 2.42	1.82 2.34	1.76 2.25	1.74 2.20	1.69 2.12	1.67 2.08	1.64 2.02	1.61 1.98	1.59 1.96
	34	4.13 7.44	3.28 5.29	2.88 4.42	2.65 3.93	2.49 3.61	2.38 3.38	2.30 3.21	2.23 3.08	2.17 2.97	2.12 2.89	2.08 2.82	2.05 2.76	2.00 2.66	1.95 2.58	1.89 2.47	1.84 2.38	1.80 2.30	1.74 2.21	1.71 2.15	1.67 2.08	1.64 2.04	1.61 1.98	1.59 1.94	1.57 1.91
	36	4.11 7.39	3.26 5.25	2.86 4.38	2.63 3.89	2.48 3.58	2.36 3.35	2.28 3.18	2.21 3.04	2.15 2.94	2.10 2.86	2.06 2.78	2.03 2.72	1.89 2.62	1.93 2.54	1.87 2.43	1.82 2.35	1.78 2.26	1.72 2.17	1.69 2.12	1.65 2.04	1.62 2.00	1.59 1.94	1.56 1.90	1.55 1.87
	38	4.10 7.35	3.25 5.21	2.85 4.34	2.62 3.86	2.46 3.54	2.35 3.32	2.26 3.15	2.19 3.02	2.14 2.91	2.09 2.82	2.05 2.75	2.02 2.69	1.96 2.59	1.92 2.51	1.85 2.40	1.80 2.32	1.76 2.22	1.71 2.14	1.67 2.08	1.63 2.00	1.60 1.97	1.57 1.90	1.54 1.86	1.53 1.84
	40	4.08 7.31	3.23 5.18	2.84 4.31	2.61 3.83	2.45 3.51	2.34 3.29	2.25 3.12	2.18 2.99	2.12 2.88	2.07 2.80	2.04 2.73	2.00 2.66	1.95 2.56	1.90 2.49	1.84 2.37	1.79 2.29	1.74 2.20	1.69 2.11	1.66 2.05	1.61 1.97	1.59 1.94	1.55 1.88	1.53 1.84	1.51 1.81
	42	4.07 7.27	3.22 5.15	2.83 4.29	2.59 3.80	2.44 3.49	2.32 3.26	2.24 3.10	2.17 2.96	2.11 2.86	2.06 2.77	2.02 2.70	1.90 2.64	1.94 2.54	1.89 2.46	1.82 2.35	1.78 2.26	1.73 2.17	1.68 2.08	1.64 2.02	1.60 1.94	1.57 1.91	1.54 1.85	1.51 1.80	1.49 1.78
	44	4.06 7.24	3.21 5.12	2.82 4.26	2.58 3.78	2.43 3.46	2.31 3.24	2.23 3.07	2.16 2.94	2.10 2.84	2.05 2.75	2.01 2.68	1.98 2.62	1.92 2.52	1.88 2.44	1.81 2.32	1.76 2.24	1.72 2.15	1.66 2.06	1.63 2.09	1.58 1.92	1.56 1.88	1.52 1.81	1.50 1.78	1.48 1.75
	46	4.05 7.21	3.20 5.10	2.81 4.24	2.57 3.76	2.42 3.44	2.30 3.22	2.22 3.05	2.14 2.92	2.09 2.82	2.04 2.73	2.00 2.66	1.97 2.50	1.91 2.42	1.87 2.30	1.80 2.22	1.75 2.13	1.71 2.04	1.65 1.98	1.62 1.90	1.57 1.88	1.54 1.86	1.51 1.80	1.48 1.76	1.46 1.72
	48	4.04 7.19	3.19 5.08	2.80 4.22	2.56 3.74	2.41 3.42	2.30 3.20	2.21 3.04	2.14 2.90	2.08 2.80	2.03 2.71	1.99 2.64	1.96 2.58	1.90 2.48	1.86 2.40	1.79 2.28	1.74 2.20	1.70 2.11	1.64 2.02	1.61 1.96	1.56 1.88	1.53 1.84	1.50 1.78	1.47 1.73	1.45 1.70
	50	4.03 7.17	3.18 5.06	2.79 4.20	2.56 3.72	2.40 3.41	2.29 3.18	2.20 3.02	2.13 2.88	2.07 2.78	2.02 2.70	1.98 2.62	1.95 2.56	1.90 2.46	1.85 2.39	1.78 2.26	1.74 2.18	1.69 2.10	1.63 2.00	1.60 1.94	1.55 1.86	1.52 1.82	1.48 1.76	1.46 1.71	1.44 1.68
	55	4.02 7.12	3.17 5.01	2.78 4.16	2.54 3.68	2.38 3.37	2.27 3.15	2.18 2.98	2.11 2.85	2.05 2.75	2.00 2.66	1.97 2.59	1.93 2.53	1.88 2.43	1.83 2.35	1.76 2.23	1.72 2.15	1.67 2.06	1.61 1.96	1.58 1.90	1.52 1.82	1.50 1.78	1.46 1.71	1.43 1.66	1.41 1.64
	60	4.00 7.08	3.15 4.98	2.76 4.13	2.52 3.65	2.37 3.34	2.25 3.12	2.17 2.95	2.10 2.82	2.04 2.72	1.99 2.63	1.95 2.56	1.92 2.50	1.86 2.40	1.81 2.32	1.75 2.20	1.70 2.12	1.65 2.03	1.59 1.93	1.56 1.87	1.50 1.79	1.48 1.74	1.44 1.68	1.41 1.63	1.39 1.60
	65	3.99 7.04	3.14 4.95	2.75 4.10	2.51 3.62	2.36 3.31	2.24 3.09	2.15 2.93	2.08 2.79	2.02 2.70	1.98 2.61	1.94 2.54	1.90 2.47	1.85 2.37	1.80 2.30	1.73 2.18	1.68 2.10	1.63 1.90	1.57 1.84	1.54 1.76	1.49 1.71	1.46 1.64	1.42 1.61	1.39 1.60	1.37 1.56
	70	3.98 7.01	3.13 4.92	2.74 4.08	2.50 3.60	2.35 3.29	2.32 3.07	2.14 2.91	2.07 2.77	2.01 2.67	1.97 2.59	1.93 2.51	1.89 2.45	1.84 2.35	1.79 2.28	1.72 2.15	1.67 2.07	1.62 1.98	1.56 1.88	1.53 1.82	1.47 1.74	1.45 1.69	1.40 1.62	1.37 1.56	1.35 1.53
	80	3.96 6.96	3.11 4.88	2.72 4.04	2.48 3.56	2.33 3.25	2.21 3.04	2.12 2.87	2.05 2.74	1.99 2.64	1.95 2.55	1.91 2.48	1.88 2.41	1.82 2.32	1.77 2.24	1.70 2.11	1.65 2.03	1.60 1.94	1.54 1.84	1.51 1.78	1.45 1.70	1.42 1.65	1.38 1.57	1.35 1.52	1.32 1.49

0.05 (light row) and 0.01 (dark row) points for the distribution of F

		Degrees of freedom for greater mean square																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	∞
Degrees of freedom for lesser mean square	100	3.94 6.90	3.09 4.82	2.70 3.98	2.46 3.51	2.30 3.20	2.19 2.99	2.10 2.82	2.03 2.69	1.97 2.59	1.92 2.51	1.88 2.43	1.85 2.36	1.79 2.26	1.75 2.19	1.68 2.06	1.63 1.98	1.57 1.89	1.51 1.79	1.48 1.73	1.42 1.64	1.39 1.59	1.34 1.51	1.30 1.46	1.28 1.43
	125	3.92 6.84	3.07 4.78	2.68 3.94	2.44 3.47	2.29 3.17	2.17 2.95	2.08 2.79	2.01 2.65	1.95 2.56	1.90 2.47	1.86 2.40	1.83 2.33	1.77 2.23	1.72 2.15	1.65 2.03	1.60 1.94	1.55 1.85	1.49 1.75	1.45 1.68	1.39 1.59	1.36 1.54	1.31 1.46	1.27 1.40	1.25 1.37
	150	3.91 6.81	3.06 4.75	2.67 3.91	2.43 3.44	2.27 3.13	2.16 2.92	2.07 2.76	2.00 2.62	1.94 2.53	1.89 2.44	1.85 2.37	1.82 2.30	1.76 2.20	1.71 2.12	1.64 2.00	1.59 1.91	1.54 1.83	1.47 1.72	1.44 1.66	1.37 1.56	1.34 1.51	1.29 1.43	1.25 1.37	1.22 1.33
	200	3.89 6.76	3.04 4.71	2.65 3.88	2.41 3.41	2.26 3.11	2.14 2.90	2.05 2.73	1.98 2.60	1.92 2.50	1.87 2.41	1.83 2.34	1.80 2.28	1.74 2.17	1.69 2.09	1.62 1.97	1.57 1.88	1.52 1.79	1.45 1.69	1.42 1.62	1.35 1.53	1.32 1.48	1.26 1.39	1.22 1.33	1.19 1.28
	400	3.86 6.70	3.02 4.66	2.62 3.83	2.39 3.36	2.23 3.06	2.12 2.85	2.03 2.69	1.96 2.55	1.90 2.46	1.85 2.37	1.81 2.29	1.78 2.23	1.72 2.12	1.67 2.04	1.60 1.92	1.54 1.84	1.49 1.74	1.42 1.64	1.38 1.57	1.32 1.47	1.28 1.42	1.22 1.32	1.16 1.24	1.13 1.19
	1000	3.85 6.66	3.00 4.62	2.61 3.80	2.38 3.34	2.22 3.04	2.10 2.82	2.02 2.66	1.95 2.53	1.89 2.43	1.84 2.34	1.80 2.26	1.76 2.20	1.70 2.09	1.65 2.01	1.58 1.89	1.53 1.81	1.47 1.71	1.41 1.61	1.36 1.54	1.30 1.44	1.26 1.38	1.19 1.28	1.13 1.19	1.08 1.11
	∞	3.84 6.64	2.99 4.60	2.60 3.78	2.37 3.32	2.21 3.02	2.09 2.80	2.01 2.64	1.94 2.51	1.88 2.41	1.83 2.32	1.79 2.24	1.75 2.18	1.69 2.07	1.64 1.99	1.57 1.87	1.52 1.79	1.46 1.69	1.40 1.59	1.35 1.52	1.28 1.41	1.24 1.36	1.17 1.25	1.11 1.15	1.00 1.00

From G. W. Snedecor, *Statistical Methods*, 5th edition. Copyright © 1956 by the Iowa State University Press, Ames, Iowa. Reprinted by permission of the publisher.

Wilcoxon table

This table gives the significance probabilities for the Wilcoxon signed-rank test for paired comparisons, for various selected values of the test statistic $W = \text{sum of all signed ranks}$. The significance probabilities included in the table are the ones closest to the commonly used levels of significance $\alpha = .10$, $\alpha = .05$, and $\alpha = .01$. Thus the table may be used to obtain the appropriate critical value of W for a given value of α , the level of significance.

The critical values c in the table correspond to the critical value for a one-sided test which rejects for large values of W . If the test is one-sided, and rejects for small (negative) values of W , then the critical value is $-c$, where c is the value in the table for which $P(W \geq c) = \text{desired level of significance}$. If the test is two-sided, then the critical value c is determined by finding the value in the table for which $P(W \geq c) = 1/2 \alpha$, where α is the desired level of significance. In this case the test is to reject H_0 if $W \leq -c$ or $W \geq c$.

Examples

- (a) The test is one-sided and rejects for large values of W . Suppose $\alpha = .05$ and $n = 8$. Then the critical value is $c = 24$, since $P(W \geq c) = .055$, and $.055$ is closest to the desired level $\alpha = .05$. Thus, the test rejects H_0 if $W \geq 24$, and accepts otherwise.
- (b) The test is one-sided and rejects for small (negative) values of W . Suppose $\alpha = .10$ and $n = 12$. The critical value is -34 , since $P(W \geq 34) = .102$, and $.102$ is the value closest to $.10$. Thus the test rejects H_0 if $W \leq -34$.
- (c) The test is two-sided. Suppose $\alpha = .05$ and $n = 20$. Then the critical values are 106 and -106 , since $P(W \geq 106) = .024$, and $.024$ is the value closest to $.025 (= 1/2\alpha)$. Thus the test rejects H_0 if $W \leq -106$ or $W \geq 106$.

n		P(W ≥ c)		n		P(W ≥ c)		n		P(W ≥ c)		n		P(W ≥ c)	
1	c	1	c	1	c	1	c	1	c	1	c	1	c	1	c
8	32	.012	12	58	.010	16	88	.011	20	124	.010	24	106	.024	28
9	39	.010	13	65	.011	17	97	.010	21	114	.010	25	109	.023	29
10	45	.010	14	73	.010	18	105	.010	22	121	.013	26	113	.025	30
11	52	.009	15	80	.011	19	114	.010	23	128	.013	27	121	.025	31
12	59	.008	16	88	.012	20	124	.010	24	135	.013	28	128	.024	32
13	66	.008	17	97	.012	21	135	.010	25	142	.013	29	135	.024	33
14	73	.008	18	105	.012	22	142	.010	26	150	.013	30	142	.024	34
15	80	.009	19	114	.011	23	150	.010	27	158	.013	31	150	.024	35
16	88	.009	20	124	.011	24	158	.010	28	166	.013	32	158	.024	36
17	97	.009	21	135	.011	25	166	.010	29	174	.013	33	166	.024	37
18	105	.009	22	142	.011	26	174	.010	30	182	.013	34	174	.024	38
19	114	.009	23	150	.011	27	182	.010	31	190	.013	35	182	.024	39
20	124	.009	24	158	.011	28	190	.010	32	198	.013	36	190	.024	40
21	135	.009	25	166	.011	29	198	.010	33	206	.013	37	198	.024	41
22	142	.009	26	174	.011	30	206	.010	34	214	.013	38	206	.024	42
23	150	.009	27	182	.011	31	214	.010	35	222	.013	39	214	.024	43
24	158	.009	28	190	.011	32	222	.010	36	230	.013	40	222	.024	44
25	166	.009	29	198	.011	33	230	.010	37	238	.013	41	230	.024	45
26	174	.009	30	206	.011	34	238	.010	38	246	.013	42	238	.024	46
27	182	.009	31	214	.011	35	246	.010	39	254	.013	43	246	.024	47
28	190	.009	32	222	.011	36	254	.010	40	262	.013	44	254	.024	48
29	198	.009	33	230	.011	37	262	.010	41	270	.013	45	262	.024	49
30	206	.009	34	238	.011	38	270	.010	42	278	.013	46	270	.024	50

TABLE IX Critical values of U

n_1	n_2	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
3	2	6	-	-	-	-	-
3	3	8	9	-	-	-	-
4	2	8	-	-	-	-	-
4	3	11	12	-	-	-	-
4	4	13	15	16	-	-	-
5	2	9	10	-	-	-	-
5	3	13	14	15	15	20	-
5	4	16	18	19	19	24	25
6	2	11	12	-	-	-	-
6	3	15	16	17	17	22	23
6	4	19	21	22	23	24	24
7	2	13	14	-	-	-	-
7	3	17	19	20	21	21	21
7	4	22	24	26	27	28	28
8	2	14	15	16	16	-	-
8	3	19	21	22	22	26	26
8	4	25	27	28	28	30	31
9	2	16	17	18	18	-	-
9	3	22	23	23	25	26	27
9	4	27	30	32	33	35	35
10	2	17	18	19	19	-	-
10	3	23	25	26	27	29	29
10	4	29	31	32	33	34	34
11	2	18	19	20	20	-	-
11	3	24	26	27	28	29	29
11	4	31	33	34	35	36	36
12	2	19	20	21	21	-	-
12	3	25	27	28	29	30	30
12	4	32	34	35	36	37	37
13	2	20	21	22	22	-	-
13	3	26	28	29	30	31	31
13	4	33	35	36	37	38	38
14	2	21	22	23	23	-	-
14	3	27	29	30	31	32	32
14	4	34	36	37	38	39	39
15	2	22	23	24	24	-	-
15	3	28	30	31	32	33	33
15	4	35	37	38	39	40	40
16	2	23	24	25	25	-	-
16	3	29	31	32	33	34	34
16	4	36	38	39	40	41	41
17	2	24	25	26	26	-	-
17	3	30	32	33	34	35	35
17	4	37	39	40	41	42	42
18	2	25	26	27	27	-	-
18	3	31	33	34	35	36	36
18	4	38	40	41	42	43	43
19	2	26	27	28	28	-	-
19	3	32	34	35	36	37	37
19	4	39	41	42	43	44	44
20	2	27	28	29	29	-	-
20	3	33	35	36	37	38	38
20	4	40	42	43	44	45	45
21	2	28	29	30	30	-	-
21	3	34	36	37	38	39	39
21	4	41	43	44	45	46	46
22	2	29	30	31	31	-	-
22	3	35	37	38	39	40	40
22	4	42	44	45	46	47	47
23	2	30	31	32	32	-	-
23	3	36	38	39	40	41	41
23	4	43	45	46	47	48	48
24	2	31	32	33	33	-	-
24	3	37	39	40	41	42	42
24	4	44	46	47	48	49	49
25	2	32	33	34	34	-	-
25	3	38	40	41	42	43	43
25	4	45	47	48	49	50	50
26	2	33	34	35	35	-	-
26	3	39	41	42	43	44	44
26	4	46	48	49	50	51	51
27	2	34	35	36	36	-	-
27	3	40	42	43	44	45	45
27	4	47	49	50	51	52	52
28	2	35	36	37	37	-	-
28	3	41	43	44	45	46	46
28	4	48	50	51	52	53	53
29	2	36	37	38	38	-	-
29	3	42	44	45	46	47	47
29	4	49	51	52	53	54	54
30	2	37	38	39	39	-	-
30	3	43	45	46	47	48	48
30	4	50	52	53	54	55	55
31	2	38	39	40	40	-	-
31	3	44	46	47	48	49	49
31	4	51	53	54	55	56	56
32	2	39	40	41	41	-	-
32	3	45	47	48	49	50	50
32	4	52	54	55	56	57	57
33	2	40	41	42	42	-	-
33	3	46	48	49	50	51	51
33	4	53	55	56	57	58	58
34	2	41	42	43	43	-	-
34	3	47	49	50	51	52	52
34	4	54	56	57	58	59	59
35	2	42	43	44	44	-	-
35	3	48	50	51	52	53	53
35	4	55	57	58	59	60	60
36	2	43	44	45	45	-	-
36	3	49	51	52	53	54	54
36	4	56	58	59	60	61	61
37	2	44	45	46	46	-	-
37	3	50	52	53	54	55	55
37	4	57	59	60	61	62	62
38	2	45	46	47	47	-	-
38	3	51	53	54	55	56	56
38	4	58	60	61	62	63	63
39	2	46	47	48	48	-	-
39	3	52	54	55	56	57	57
39	4	59	61	62	63	64	64
40	2	47	48	49	49	-	-
40	3	53	55	56	57	58	58
40	4	60	62	63	64	65	65
41	2	48	49	50	50	-	-
41	3	54	56	57	58	59	59
41	4	61	63	64	65	66	66
42	2	49	50	51	51	-	-
42	3	55	57	58	59	60	60
42	4	62	64	65	66	67	67
43	2	50	51	52	52	-	-
43	3	56	58	59	60	61	61
43	4	63	65	66	67	68	68
44	2	51	52	53	53	-	-
44	3	57	59	60	61	62	62
44	4	64	66	67	68	69	69
45	2	52	53	54	54	-	-
45	3	58	60	61	62	63	63
45	4	65	67	68	69	70	70
46	2	53	54	55	55	-	-
46	3	59	61	62	63	64	64
46	4	66	68	69	70	71	71
47	2	54	55	56	56	-	-
47	3	60	62	63	64	65	65
47	4	67	69	70	71	72	72
48	2	55	56	57	57	-	-
48	3	61	63	64	65	66	66
48	4	68	70	71	72	73	73
49	2	56	57	58	58	-	-
49	3	62	64	65	66	67	67
49	4	69	71	72	73	74	74
50	2	57	58	59	59	-	-
50	3	63	65	66	67	68	68
50	4	70	72	73	74	75	75
51	2	58	59	60	60	-	-
51	3	64	66	67	68	69	69
51	4	71	73	74	75	76	76
52	2	59	60	61	61	-	-
52	3	65	67	68	69	70	70
52	4	72	74	75	76	77	77
53	2	60	61	62	62	-	-
53	3	66	68	69	70	71	71
53	4	73	75	76	77	78	78
54	2	61	62	63	63	-	-
54	3	67	69	70	71	72	72
54	4	74	76	77	78	79	79
55	2	62	63	64	64	-	-
55	3	68	70	71	72	73	73
55	4	75	77	78	79	80	80
56	2	63	64	65	65	-	-
56	3	69	71	72	73	74	74
56	4	76	78	79	80	81	81
57	2	64	65	66	66	-	-
57	3	70	72	73	74	75	75
57	4	77	79	80	81	82	82
58	2	65	66	67	67	-	-
58	3	71	73	74	75	76	76
58	4	78	80	81	82	83	83
59	2	66	67	68	68	-	-
59	3	72	74	75	76	77	77
59	4	79	81	82	83	84	84
60	2	67	68	69	69	-	-
60	3	73	75	76	77	78	78
60	4	80	82	83	84	85	85
61	2	68	69	70	70	-	-
61	3	74	76	77	78	79	79
61	4	81	83	84	85	86	86
62	2	69	70	71	71	-	-
62	3	75	77	78	79	80	80
62	4	82	84	85	86	87	87
63	2	70	71	72	72	-	-
63	3	76	78	79	80	81	81
63	4	83	85	86	87	88	88
64	2	71	72	73	73	-	-
64	3	77	79	80	81	82	82
64	4	84	86	87	88	89	89
65	2	72	73	74	74	-	-
65	3	78	80	81	82	83	83
65	4	85	87	88	89	90	90
66	2	73	74	75	75	-	-
66	3	79	81	82	83	84	84
66	4	86	88	89	90	91	91
67	2	74	75	76	76	-	-
67	3	80	82	83	84	85	85
67	4	87	89	90	91	92	92
68	2	75	76	77	77	-	-
68	3	81	83	84	85	86	86
68	4	88	90	91	92	93	93
69	2	76	77	78	78	-	-
69	3	82	84	85	86	87	87
69	4	89	91	92	93	94	94
70	2	77	78	79	79	-	-
70	3	83	85	86	87	88	88
70	4	90	92	93	94	95	95
71	2	78	79	80	80	-	-
71	3	84	86	87	88	89	89
71	4	91	93	94	95	96	96
72	2	79	80	81	81	-	-
72	3	85	87	88	89	90	90
72	4	92	94				

TABLE III Critical values of *t*

For any given *df*, the table shows the values of *t* corresponding to various levels of probability. Obtained *t* is significant at a given level if it is equal to or greater than the value shown in the table.

df	Level of significance for one-tailed test					
	.10	.05	.025	.01	.005	.0005
	Level of significance for two-tailed test					
	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

From R. A. Fisher and F. Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, published by Longman Group Ltd., London (previously published by Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh) and by permission of the authors and publishers.

TABLE X Critical values of F_{\max}

$p \alpha$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	39.0 199.	87.5 448.	142. 729.	202. 1036.	266. 1362.	333. 1705.	403. 2063.	475. 2432.	550. 2813.	626. 3204.	704. 3605.
3	15.4 47.5	27.8 85.	39.2 120.	50.7 151.	62.0 184.	72.9 21(6)	83.5 24(9)	93.9 28(1)	104. 31(0)	114. 33(7)	124. 36(1)
4	9.60 23.2	15.5 37.	20.6 49.	25.2 59.	29.5 69.	33.6 79.	37.5 89.	41.1 97.	44.6 106.	48.0 113.	51.4 120.
5	7.15 14.9	10.8 22.	13.7 28.	16.3 33.	18.7 38.	20.8 42.	22.9 46.	24.7 50.	26.5 54.	28.2 57.	29.9 60.
6	5.82 11.1	8.38 15.5	10.4 19.1	12.1 22.	13.7 25.	15.0 27.	16.3 30.	17.5 32.	18.6 34.	19.7 36.	20.7 37.
7	4.99 8.89	6.94 12.1	8.44 14.5	9.70 16.5	10.8 18.4	11.8 20.	12.7 22.	13.5 23.	14.3 24.	15.1 26.	15.8 27.
8	4.43 7.50	6.00 9.9	7.18 11.7	8.12 13.2	9.03 14.5	9.78 15.8	10.5 16.9	11.1 17.9	11.7 18.9	12.2 19.8	12.7 21.
9	4.03 6.54	5.34 8.5	6.31 9.9	7.11 11.1	7.80 12.1	8.41 13.1	8.95 13.9	9.45 14.7	9.91 15.3	10.3 16.0	10.7 16.6
10	3.72 5.85	4.85 7.4	5.67 8.6	6.34 9.6	6.92 10.4	7.42 11.1	7.87 11.8	8.28 12.4	8.66 12.9	9.01 13.4	9.34 13.9
12	3.28 4.91	4.16 6.1	4.79 6.9	5.30 7.6	5.72 8.2	6.09 8.7	6.42 9.1	6.72 9.5	7.00 9.9	7.25 10.2	7.48 10.6
15	2.86 4.07	3.54 4.9	4.01 5.5	4.37 6.0	4.68 6.4	4.95 6.7	5.19 7.1	5.40 7.3	5.59 7.5	5.77 7.8	5.98 8.0
20	2.46 3.32	2.95 3.8	3.29 4.3	3.54 4.6	3.76 4.9	3.94 5.1	4.10 5.3	4.24 5.5	4.37 5.6	4.49 5.8	4.59 5.9
30	2.07 2.63	2.40 3.0	2.61 3.3	2.78 3.4	2.91 3.6	3.02 3.7	3.12 3.8	3.21 3.9	3.29 4.0	3.36 4.1	3.39 4.2
60	1.67 1.96	1.85 2.2	1.96 2.3	2.04 2.4	2.11 2.4	2.17 2.5	2.22 2.5	2.26 2.6	2.30 2.6	2.33 2.7	2.36 2.7
∞	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

From H. A. David, *Biometrika*, 39, 422-4. Reprinted by permission of the Biometrika trustees.