
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2002/2003

September 2002

BOI 109/4 - Biostatistik

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat soalan yang bercetak dan SEPULUH muka surat lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia.

Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.

ARAHAN: Gunakan kaedah parametrik bagi semua analisis melainkan jika syarat tidak di penuhi.

1. Dugong merupakan mamalia laut yang hidup secara berkumpulan. Tanpa pengaruh luar sesuatu kumpulan selalunya terdiri daripada lebih kurang 50 ekor dugong. Kebelakangan ini, disebabkan oleh aktiviti manusia, pergerakan dugong ini agak terhad dan ini mengakibatkan peningkatan pembiakan dalaman yang seterusnya mengakibatkan ketidakseragaman berat haiwan tersebut. Seorang penyelidik telah membuat kajian di kawasan Selat Johor dengan menimbang berat 20 ekor dugong yang telah ditangkap. Datanya (dalam unit kg) adalah seperti berikut:

350 378 361 280 346 289 377 360 374 392
383 345 291 378 395 365 284 390 388 345

- (a) Apakah selang keyakinan 95% bagi min berat populasi dugong ini?
- (b) Apakah selang keyakinan 99% bagi varians berat populasi dugong ini?
- (c) Penyelidik telah mendapat maklumat bahawa varians berat populasi dugong di kawasan berkenaan sebelum dipengaruhi oleh aktiviti manusia ialah 990 g^2 . Berasaskan maklumat-maklumat ini bolehkah kita menyokong dakwaan yang mengatakan pengaruh aktiviti manusia mengakibatkan berat dugong yang kurang seragam?

(20 markah)

2. (a) Tuliskan ringkasan untuk membezakan antara nilai α dan aras bererti p.

(7 markah)

- (b) Cekera Secchi merupakan suatu alat mudah yang biasa digunakan untuk menentukan kejernihan atau kekeruhan sesuatu badan air. Untuk menentukan nilai tersebut, cekera ini (yang diikat dengan tali) diturunkan ke dalam air. Apabila cekera ini mula hilang daripada penglihatan, kedalaman direkodkan. Bagi air yang jernih, nilai kedalaman ini tinggi manakala bagi air yang keruh nilainya rendah. Seorang pelajar daripada Pusat Kajian Samudera dan Pantai, USM, telah menjalankan kajian di persekitaran perairan Pulau Payar, Kedah, dan Pulau Kendi, P. Pinang. Dia menentukan kedalaman cekera Secchi di beberapa lokasi di kedua-dua pulau ini. Datanya (diberi dalam unit m) adalah seperti yang disertakan. **Dengan andaian data ini datangnya daripada populasi yang tidak bertaburan normal**, jalankan ujian statistik yang sesuai bagi membandingi kejernihan/kekeruhan perairan dua pulau ini.

Pulau Payar	Pulau Kendi
4.2	2.8
3.9	3.5
4.1	2.9
3.8	3.6
3.5	2.9
4.0	3.1
4.4	3.0
3.4	3.4
3.7	3.3
3.5	3.8
	3.6
	2.8

(13 markah)

3. Seorang penyelidik telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan karbon dioksida terhadap kadar pernafasan. Seorang sukarelawan telah bersetuju untuk melibatkan diri di dalam eksperimen ini. Semasa eksperimen dijalankan, sukarelawan tersebut diminta menyedut udara daripada sebuah bag yang mengandungi kandungan karbon dioksida yang telah ditetapkan. Kandungan karbon dioksida (diukur dalam bentuk tekanan bahagian atau 'partial pressure' dan dilaporkan dalam unit tor) dan kadar pernafasan direkodkan seperti di bawah:

Tekanan Bahagian CO ₂ (tor)	Kadar Pernafasan nafas/minit
40	13.2
42	14.6
44	16.6
46	16.7
48	18.3
50	18.2
30	8.1
32	8.0
34	9.9
36	11.2
38	11.0
28	7.8

- (a) Adakah pertalian antara dua parameter ini berbentuk korelasi atau regresi? Kenapa?
- (b) Tunjukkan pertalian tersebut dengan suatu persamaan.
- (c) Nyatakan berapa kuatkah pertalian tersebut.
- (d) Jika sukarelawan tersebut menyedut udara yang mengandungi 52 tor CO₂, apakah anggaran kadar pernafasannya? Adakah anggaran ini baik? Huraikan.

(20 markah)

4. Melalui laporan yang telah diterbitkan, anda mengetahui bahawa hasil padi boleh dipengaruhi oleh jenis baja yang digunakan dan juga kepadatan tanaman padi tersebut. Anda ingin mengkaji dakwaan ini dengan menggunakan 4 jenis baja yang berbeza dan 3 kepadatan tanaman pokok padi. Huraikan bagaimana anda akan menjalankan eksperimen ini berserta andaian-andaian yang perlu dibuat. Seterusnya huraikan juga kaedah statistik yang sesuai bagi menganalisis data yang akan dihasilkan. Bagi penghuraian statistik, sertakan hipotesis, ujian statistik, kawasan tolak dan kesimpulan jika H_0 ditolak.

(20 markah)

5. (a) Suatu kajian telah dijalankan tentang taburan organisma yang dikaitkan dengan spesies bunga karang yang berbeza. Bagi kajian tersebut, 3 spesies bunga karang telah dipilih dan kumpulan karang tertentu dikenalpasti. Seterusnya bilangan siput spesies A, B, dan C yang terdapat pada bunga karang direkodkan. Datanya adalah seperti yang disertakan.

	Bunga Karang			Jumlah
	<i>Pocillopora eydouxi</i>	<i>Acropora</i> sp.	<i>Acropora aspera</i>	
Spesies A	6	2	14	22
Spesies B	7	21	1	29
Spesies C	15	30	18	63

Berasaskan data ini dan dengan menjalankan analisis statistik, beri kesimpulan sama ada taburan spesies siput sama atau berbeza bagi 3 kumpulan bunga karang ini.

≠ 111 (12 markah)

- (b) Berasaskan model Mendel, progeneri kacukan sendiri ('self-fertilization') sejenis bunga dijangkakan akan menghasilkan bunga merah, merah jambu dan putih dalam nisbah 1:2:1. Sejumlah 240 progeneri dihasilkan dengan 55 pokok bunga merah, 132 merah jambu dan 53 pokok bunga putih. Adakah data ini secocok dengan model Mendel?

(8 markah)

6. (a) Beri huraian mengenai taburan Poisson. (7 markah)
- (b) Satu daripada kesan sampingan yang mungkin berlaku jika seseorang wanita itu mengamalkan kontraseptif oral (mengambil pil pencegah kehamilan) ialah peningkatan tekanan darah. Di bawah disertakan nilai tekanan darah sistoli bagi 13 orang wanita yang diambil sebelum dan selepas mengamalkan kontraseptif oral bagi jangka masa 6 bulan. Dengan andaian tekanan darah sistoli bertaburan normal, adakah data ini menyaranakan bahawa pengamalan kontraseptif oral mengakibatkan peningkatan tekanan darah?

Wanita	Sebelum Mengambil Pil	Semasa Mengambil Pil
1	113	118
2	117	123
3	111	114
4	107	115
5	115	122
6	134	140
7	121	120
8	108	108
9	106	111
10	125	130
11	130	134
12	119	118
13	125	127

(13 markah)

FORMULA YANG MUNGKIN DIPERLUKAN

$$A. z = \frac{\bar{y} - u_0}{\sigma_{\bar{y}}}$$

$$B. t = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}{s\sqrt{(1/n_1) + (1/n_2)}}$$

$$C. t = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}{\sqrt{(s_1^2/n_1) + (s_2^2/n_2)}}$$

$$D. z = \frac{y - 0.5n}{\sqrt{0.25n}}$$

$$E. t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$$

$$F. s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$G. |t'| = \frac{(t_1 s_1^2/n_1) + (t_2 s_2^2/n_2)}{(s_1^2/n_1) + (s_2^2/n_2)}$$

$$H. \chi^2 = \frac{\sum(n_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

$$I. S_d^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum d_i^2 - \frac{(\sum d_i)^2}{n} \right]$$

$$K. (i) \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} \right]$$

$$(ii) \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

L. Ujian statistik Friedman

$$1. \chi_r^2 = \frac{12}{ba(a+1)} \sum_{i=1}^a R_i^2 - 3b(a+1)$$

M. Ujian statistik Wilcoxon

$$1. \mu_T = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$2. \sigma_T = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

$$3. Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T}$$

N. Ujian statistik Mann - Whitney

$$1. U = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$$

$$2. U' = n_1 n_2 - U$$

O. Ujian Blok Rawak:

$$1. TSS = \sum \sum Y_{ij}^2 - \frac{G^2}{n}$$

$$2. SST = \sum \frac{T_i^2}{b} - \frac{G^2}{n}$$

$$3. SSB = \sum \frac{B_j^2}{t} - \frac{G^2}{n}$$

P. Ujian Segiempat sama Latin

$$1. \text{ SST} = \sum \frac{T_i^2}{t} - \frac{G^2}{n}$$

$$2. \text{ SSR} = \sum \frac{R_j^2}{t} - \frac{G^2}{n}$$

$$3. \text{ SSC} = \sum \frac{C_k^2}{t} - \frac{G^2}{n}$$

Q. Eksperimen Faktor-an

$$1. \text{ SSA} = \sum \frac{A_i^2}{n_A} - \frac{G^2}{n}$$

$$2. \text{ SSB} = \sum \frac{B_j^2}{n_B} - \frac{G^2}{n}$$

$$3. \sum \sum \frac{(AB)_{ij}^2}{n_{AB}} - \text{SSA} - \text{SSB} - \frac{G^2}{n} = \text{SSAB}$$

R. Ujian Sepenuh rawak:

$$1. \text{ SSB} = \sum \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{G^2}{n}$$

S. Regresi


$$\text{SS}_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \quad \text{SS}_{xy} = \sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}$$

$$r = \frac{\text{SS}_{xy}}{\sqrt{\text{SS}_{xx} \text{SS}_{yy}}} \quad \frac{\text{SS}_{xy}}{\text{SS}_{xx}}$$

T. Perbandingan berganda:

$$\text{LSD} = t_{\alpha/2} \sqrt{s_w^2 \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} \quad \text{Wr} = q_{\alpha} (r, v) \sqrt{\frac{\text{sw}^2}{n}}$$

Jadual 1: Keluasan Lengkung Normal



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

This table is abridged from Table I of *Statistical Tables and Formulas*, by A. Hald (New York: John Wiley & Sons, 1952). Reproduced by permission of A. Hald and the publishers, John Wiley & Sons.

Jadual 3: Nilai Peratusan Taburan F



1

Degrees of freedom (α = .05)

df ₁ \ df ₂	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.5	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	16.13	16.53	16.68	16.75	16.80	16.83	16.85	16.87	16.88	16.90	16.91	16.92	16.93	16.94	16.95	16.96	16.97	16.98	16.99
4	14.71	15.04	15.17	15.23	15.28	15.31	15.33	15.35	15.36	15.37	15.38	15.39	15.40	15.41	15.42	15.43	15.44	15.45	15.46
5	13.75	14.03	14.14	14.20	14.25	14.28	14.30	14.32	14.33	14.34	14.35	14.36	14.37	14.38	14.39	14.40	14.41	14.42	14.43
6	13.00	13.24	13.33	13.38	13.42	13.45	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59
7	12.41	12.61	12.69	12.73	12.77	12.80	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89	12.90	12.91	12.92	12.93	12.94
8	11.91	12.08	12.15	12.19	12.23	12.26	12.28	12.29	12.30	12.31	12.32	12.33	12.34	12.35	12.36	12.37	12.38	12.39	12.40
9	11.46	11.61	11.67	11.71	11.75	11.78	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.86	11.87	11.88	11.89	11.90	11.91	11.92
10	11.05	11.18	11.23	11.27	11.30	11.33	11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40	11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46	11.47
11	10.68	10.79	10.83	10.87	10.90	10.92	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98	10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06
12	10.34	10.43	10.47	10.50	10.53	10.55	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69
13	10.03	10.11	10.14	10.17	10.20	10.22	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36
14	9.75	9.82	9.85	9.88	9.90	9.92	9.94	9.95	9.96	9.97	9.98	9.99	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06
15	9.49	9.55	9.58	9.61	9.63	9.65	9.66	9.67	9.68	9.69	9.70	9.71	9.72	9.73	9.74	9.75	9.76	9.77	9.78
16	9.25	9.30	9.33	9.35	9.37	9.39	9.40	9.41	9.42	9.43	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.50	9.51	9.52
17	9.03	9.07	9.10	9.12	9.14	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29
18	8.83	8.86	8.89	8.91	8.93	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	9.00	9.01	9.02	9.03	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08
19	8.64	8.67	8.70	8.72	8.74	8.76	8.77	8.78	8.79	8.80	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89
20	8.47	8.49	8.51	8.53	8.55	8.57	8.58	8.59	8.60	8.61	8.62	8.63	8.64	8.65	8.66	8.67	8.68	8.69	8.70
21	8.31	8.33	8.35	8.37	8.39	8.41	8.42	8.43	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.50	8.51	8.52	8.53	8.54
22	8.16	8.18	8.20	8.22	8.24	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.34	8.35	8.36	8.37	8.38	8.39
23	8.02	8.04	8.06	8.08	8.10	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25
24	7.89	7.91	7.93	7.95	7.97	7.99	8.00	8.01	8.02	8.03	8.04	8.05	8.06	8.07	8.08	8.09	8.10	8.11	8.12
25	7.77	7.79	7.81	7.83	7.85	7.87	7.88	7.89	7.90	7.91	7.92	7.93	7.94	7.95	7.96	7.97	7.98	7.99	8.00
26	7.66	7.68	7.70	7.72	7.74	7.76	7.77	7.78	7.79	7.80	7.81	7.82	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	7.88	7.89
27	7.56	7.58	7.60	7.62	7.64	7.66	7.67	7.68	7.69	7.70	7.71	7.72	7.73	7.74	7.75	7.76	7.77	7.78	7.79
28	7.47	7.49	7.51	7.53	7.55	7.57	7.58	7.59	7.60	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65	7.66	7.67	7.68	7.69	7.70
29	7.39	7.41	7.43	7.45	7.47	7.49	7.50	7.51	7.52	7.53	7.54	7.55	7.56	7.57	7.58	7.59	7.60	7.61	7.62
30	7.31	7.33	7.35	7.37	7.39	7.41	7.42	7.43	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48	7.49	7.50	7.51	7.52	7.53	7.54
40	7.00	7.02	7.04	7.06	7.08	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23
60	6.75	6.77	6.79	6.81	6.83	6.85	6.86	6.87	6.88	6.89	6.90	6.91	6.92	6.93	6.94	6.95	6.96	6.97	6.98
120	6.55	6.57	6.59	6.61	6.63	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.77	6.78
∞	6.39	6.41	6.43	6.45	6.47	6.49	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.59	6.60	6.61	6.62

From "Tables of Percentage Points of the Inverted Beta (F)-Distribution," *Biometrika*, Vol. 33 (1943), pp. 73-88, by Gladys Merrington and Catherine M. Thompson. Reproduced by permission of the *Biometrika* Trustees.

Jadual 5: Titik Peratusan Taburan ki-gandua



df	a = .995	a = .990	a = .975	a = .950	a = .900	a = .10	a = .05	a = .025	a = .010	a = .005	df
1	0.0000393	0.0001571	0.0009821	0.0039321	0.0157908	2.70554	3.84146	5.02389	6.63490	7.87944	1
2	0.0100251	0.0201007	0.0506356	0.102587	0.210720	4.60517	5.99147	7.37776	9.21034	10.5966	2
3	0.0717212	0.114832	0.215795	0.351846	0.584375	6.25139	7.81473	9.34840	11.3267	12.8381	3
4	0.206990	0.297110	0.484419	0.710721	1.063623	7.77944	9.48773	11.1433	13.2767	14.8602	4
5	0.411740	0.554300	0.831211	1.145476	1.61031	9.23635	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496	5
6	0.675727	0.872085	1.237347	1.63539	2.20413	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476	6
7	0.989265	1.239043	1.68987	2.16735	2.89311	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777	7
8	1.344419	1.646482	2.17973	2.73264	3.48954	13.3616	15.5073	17.5346	20.0902	21.9550	8
9	1.734926	2.007912	2.70039	3.32511	4.16816	14.6637	16.9190	19.0228	21.6660	23.5893	9
10	2.15585	2.5821	3.24697	3.94030	4.86518	15.9871	18.3070	20.4831	23.2093	25.1882	10
11	2.60321	3.05347	3.81575	4.57481	5.57779	17.2750	19.6751	21.9200	24.7250	26.7569	11
12	3.07382	3.57056	4.40379	5.22603	6.30380	18.5494	21.0261	23.3367	26.2170	28.2995	12
13	3.56503	4.10691	5.00874	5.89106	7.04150	19.8119	22.3621	24.7356	27.6683	29.8194	13
14	4.07468	4.66043	5.62872	6.57063	7.78953	21.0642	23.6840	26.1190	29.1413	31.3193	14
15	4.60094	5.22935	6.26214	7.26094	8.54675	22.3072	24.9958	27.4804	30.5779	32.8013	15
16	5.14224	5.81221	6.90766	7.96164	9.31223	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999	34.2672	16
17	5.69724	6.40776	7.56418	8.67176	10.0852	24.7690	27.5871	30.1910	33.4007	35.7185	17
18	6.26401	7.01491	8.23075	9.39046	10.8649	25.9804	28.8693	31.5264	34.8053	37.1564	18
19	6.84398	7.63273	8.96555	10.1170	11.6509	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908	38.5822	19
20	7.43386	8.26040	9.59083	10.8500	12.4426	28.4120	31.4104	34.1696	37.5662	39.9968	20
21	8.03366	8.89720	10.28293	11.5913	13.2396	29.6151	32.6705	35.4789	38.9321	41.4010	21
22	8.64272	9.54249	10.9823	12.3300	14.0415	30.8133	33.9244	36.7807	40.2894	42.7956	22
23	9.26042	10.19567	11.6885	13.0905	14.8479	32.0069	35.1725	38.0757	41.6304	44.1813	23
24	9.88623	10.8564	12.4011	13.8484	15.6587	33.1963	36.4151	39.3641	42.9798	45.5585	24
25	10.5197	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	34.3816	37.6525	40.6465	44.3141	46.9278	25
26	11.1603	12.1981	13.8439	15.3791	17.2919	35.5631	38.8852	41.9232	45.6417	48.2099	26
27	11.8076	12.8786	14.5733	16.1513	18.1138	36.7412	40.1133	43.1944	46.9630	49.6449	27
28	12.4613	13.5648	15.3079	16.9279	18.9392	37.9159	41.3372	44.4607	48.2782	50.9933	28
29	13.1211	14.2565	16.0471	17.7083	19.7677	39.0875	42.5569	45.7222	49.5879	52.3356	29
30	13.7867	14.9535	16.7908	18.4926	20.5992	40.2560	43.7729	46.9792	50.8922	53.6720	30
40	20.7065	22.1643	24.4331	26.5093	29.0505	51.8050	55.7505	59.3417	63.6907	66.7659	40
50	27.9907	29.7067	32.3574	34.7642	37.6886	63.1671	67.5048	71.4202	76.1539	79.4900	50
60	35.5346	37.4848	40.4817	43.1879	46.4509	74.3970	79.0819	83.2976	88.3794	91.9517	60
70	43.2752	45.4418	48.7576	51.7393	55.3290	85.5271	90.5312	95.0231	100.425	104.215	70
80	51.1720	53.5400	57.1532	60.3915	64.2778	96.5702	101.879	106.629	112.329	116.321	80
90	59.1963	61.7541	65.6466	69.1260	73.2912	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299	90
100	67.3276	70.0648	74.2219	77.9295	82.3581	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169	100

From "Tables of the Percentage Points of the X²-Distribution," Biometrika, Vol. 1 (1941), pp. 188-189, by Catherine M. Thomson. Reprinted by permission of Cambridge University Press.

Jadual 6: Nilai Genting bagi Taburan U Mann-Whitney

		$\alpha(2):$	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
		$\alpha(1):$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
n_1	n_2									
8	8		194	210	220	232	240	247	255	260
	9		203	215	226	238	246	253	261	267
	10		208	221	231	244	252	259	268	273
9	9		56	60	64	67	70	72	74	76
	10		62	66	70	74	77	79	82	83
	11		68	72	76	81	83	86	89	91
	12		73	78	82	87	90	93	96	98
	13		79	84	88	94	97	100	103	106
	14		85	90	95	100	104	107	111	113
	15		90	96	101	107	111	114	118	120
	16		96	102	107	113	117	121	125	128
	17		101	108	114	120	124	128	132	135
	18		107	114	120	126	131	135	139	142
	19		113	120	126	133	138	142	146	150
	20		118	126	132	140	144	149	154	157
	21		124	132	139	146	151	155	161	164
	22		130	138	145	153	158	162	168	172
	23		135	144	151	159	164	169	175	179
	24		141	150	157	166	171	176	182	186
	25		147	156	163	172	178	183	189	193
	26		152	162	170	179	185	190	196	201
	27		158	168	176	185	191	197	203	208
	28		164	174	182	192	198	204	211	215
	29		169	179	188	198	205	211	218	222
	30		175	185	194	205	212	218	225	230
	31		180	191	201	211	218	224	232	237
	32		186	197	207	218	225	231	239	244
	33		192	203	213	224	232	238	246	251
	34		197	209	219	231	238	245	253	259
	35		203	215	226	237	245	252	260	266
	36		209	221	232	244	252	259	267	273
	37		214	227	238	250	258	266	275	280
	38		220	233	244	257	265	273	282	288
	39		225	239	250	263	272	280	289	295
9	40		231	245	257	270	279	286	296	302
10	10		61	73	77	81	84	87	90	92
	11		74	79	84 ✓	88 ✓	92	94	98	100
	12		81	86	91	96	99	102	106	108
	13		87	93	97	103	106	110	113	116
	14		93	99	104	110	114	117	121	124
	15		99	106	111	117	121	125	129	132
	16		106	112	118	124	129	133	137	140
	17		112	119	125	132	136	140	145	148
	18		118	125	132	139	143	148	153	156
	19		124	132	138	146	151	155	161	164
	20		130	138	145	153	158	163	168	172
10	21		137	145	152	160	165	170	176	180

Jadual 7: Nilai Genting bagi Ujian Pangkat Bertanda Wilcoxon

$n = 5(1)50$

One-sided	Two-sided	$n = 5$	$n = 6$	$n = 7$	$n = 8$	$n = 9$	$n = 10$	$n = 11$	$n = 12$	$n = 13$	$n = 14$	$n = 15$	$n = 16$
.05	.10	1	2	4	6	8	11	14	17	21	26	30	36
.025	.05		1	2	4	6	8	11	14	17	21	25	30
.01	.02			0	2	3	5	7	10	13	16	20	24
.005	.01				0	2	3	5	7	10	13	16	19
		$n = 17$	$n = 18$	$n = 19$	$n = 20$	$n = 21$	$n = 22$	$n = 23$	$n = 24$	$n = 25$	$n = 26$	$n = 27$	$n = 28$
.05	.10	41	47	54	60	68	75	83	92	101	110	120	130
.025	.05	35	40	46	52	59	66	73	81	90	98	107	117
.01	.02	28	33	38	43	49	56	62	69	77	85	93	102
.005	.01	23	28	32	37	43	49	55	61	68	76	84	92
		$n = 29$	$n = 30$	$n = 31$	$n = 32$	$n = 33$	$n = 34$	$n = 35$	$n = 36$	$n = 37$	$n = 38$	$n = 39$	
.05	.10	141	152	163	175	188	201	214	228	242	256	271	
.025	.05	127	137	148	159	171	183	195	208	222	235	250	
.01	.02	111	120	130	141	151	162	174	186	198	211	224	
.005	.01	100	109	118	128	138	149	160	171	183	195	208	
		$n = 40$	$n = 41$	$n = 42$	$n = 43$	$n = 44$	$n = 45$	$n = 46$	$n = 47$	$n = 48$	$n = 49$	$n = 50$	
.05	.10	287	303	319	336	353	371	389	408	427	446	466	
.025	.05	264	279	295	311	327	344	361	379	397	415	434	
.01	.02	238	252	267	281	297	313	329	345	362	380	398	
.005	.01	221	234	248	262	277	292	307	323	339	356	373	

From *Some Rapid Approximate Statistical Procedures (Revised)* by Frank Wilcoxon and Roberta A. Wilcox (Pearl River, N.Y.: Lederle Laboratories, 1964), Table 2. Reproduced by permission of Lederle Laboratories, a division of American Cyanamid Company.