

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1994/95

April 1995

ZSE 333/3 - Pengantar Biofizik Sinaran

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetak dan TIGA muka surat Jadual Nilai Radiologikal sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Berikan takrifan bagi keradioaktifan.

(10 markah)

(b) Bincangkan dengan teliti reputan melalui β^- (elektron) dan β^+ (positron). Bagaimanakah taburan tenaga zarah beta bagi setiap proses?

(25 markah)

(c) Katakan 1 g potassium 40 (^{40}K) tulen memancarkan 10^5 sinar beta per saat. Hitungkan

(i) pemalar reputan λ .

(ii) setengah hayat dan hayat purata bagi ^{40}K .

(iii) Apakah perbezaan di antara setengah hayat dan hayat purata?

(30 markah)

(d) Suatu foil emas (Au) disinari dengan ketumpatan fluks neutron terma $10^{13} \text{ n cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Jisim foilnya 3.5 mg dan ^{198}Au membentuk 80% daripada emas aslinya. Keratan rentas bagi tindakbalas ialah $\sigma = 96 \times 10^{-24} \text{ cm}^2/\text{atom}$ dan $t_{\frac{1}{2}} = 2.70$ hari bagi ^{198}Au .

(i) Hitungkan masa sinaran supaya ^{198}Au mencapai aktiviti 100 mCi.

...2/-

- (ii) Kalau tiada reputan bagi ^{198}Au , tentukan masa sinaran untuk mencapai aktiviti yang sama.

(35 markah)

2. (a) Bincangkan secara ringkas saling tindakan fotoelektrik, Compton dan penghasilan pasangan yang berlaku di antara foton dengan jirim. Manakah saling tindakan yang sesuai untuk menghasilkan imej sinar-X diagnostik? Berikan sebabnya.

(25 markah)

- (b) Suatu bim sempit mengandungi 10^{10} foton yang bertenaga 6 MeV. Foton itu menghentam secara bertegak lurus suatu lapisan plumbum. Ketebalan plumbumnya 12 mm dan ketumpatannya 11.3 g cm^{-3} .

- (i) Tentukan bilangan saling tindakan bagi fotoelektrik, Compton, koheren dan penghasilan pasangan yang berlaku dalam plumbum.
- (ii) Tentukan banyak mana tenaga yang dipindahkan kepada zarah beras bagi setiap jenis saling tindakan. Nisbah bagi $\bar{E}_{\text{tr}}/E = 0.064$ bagi saling tindakan Compton.
- (iii) Jika suatu pengesan diletak di belakang plumbum, tentukan bilangan foton yang dapat dikesan.

(35 markah)

- (c) Nyatakan perbezaan di antara pekali pengecilan jisim dan kuasa penghenti jisim. Berikan faktor-faktor yang mempengaruhi kuasa penghenti jisim.

(15 markah)

- (d) 500 keV elektron melalui air. Hitungkan julat bagi elektron secara terus dan secara menggunakan kaedah csdn (continuous slowing down approximation). Dapatkan nilai berkenaan dalam jadual yang diberikan. Mengapa keduanya nilainya berbeza? Bolehkah puncak Bragg didapati bagi elektron? Jelaskan jawapan anda.

(25 markah)

3. (a) Bincangkan mengenai setiap fungsi berikut bagi tiub Geiger-Muller:

(i) Perubahan tinggi denyutan dengan voltan yang digunakan.

(ii) Keperluan gas 'quench' dan fungsinya.

(iii) Keupayaan untuk membezakan di antara zarah beras berat dan sinaran elektron.

(15 markah)

(b) Berikan kebaikan dan keburukan bagi pengesan semikonduktor kalau dibanding dengan pengesan NaI(Tl). Katakan sinar- γ yang bertenaga 4 MeV melalui pengesan NaI(Tl). Lakarkan spektrum differensial yang didapati dan hitungkan tenaga bagi setiap puncak. Juga lakarkan spektrum integral yang sepadan dengan spektrum differensial itu.

(40 markah)

(c) Bincangkan kerma, dos serapan dan perhubungan di antaranya.

(15 markah)

(d) Suatu sinar- γ bertenaga 10 MeV memasuki isipadu v (0.1 cm^3). Sinar- γ itu melakukan penghasilan pasangan dan elektron dan positron yang dihasilkan mempunyai tenaga kinetik yang sama. Elektron itu menghilang setengah tenaga kinetiknya dalam pelanggaran sebelum melepas dari v . Positron itu juga menghilang setengah tenaga kinetik dalam pelanggaran sebelum dimusnahabiskan. Foton yang terhasil dalam pemusnahabisan melepas dari v . Ketumpatan v ialah 1 g cm^{-3} .

(i) Lakarkan rajah untuk tindakbalas-tindakbalas tersebut yang berlaku dalam v .

(ii) Tentukan kerma dalam v .

(iii) Tentukan dos serapan dalam v .

(iv) Hitungkan tenaga foton yang melepas dari v .

(30 markah)

...4/-

4. (a) Nisbah penghidupan bagi sel untuk sinar- γ dan zarah neutron masing-masing adalah 0.1 dan 0.01 bagi dos serapan yang sama. Mengapakah nisbah penghidupannya berbeza?

(25 markah)

(b) Bincangkan secara ringkas mengenai teori hentaman/sasaran tunggal dan teori multi-hentaman/sasaran tunggal bagi sel maut oleh penyinaran.

(25 markah)

(c) Hitungkan pecahan kebolehidupan sel bagi sel yang telah menerima dos 2 Gy. Anggapkan D_0 bagi selnya 1.2 Gy. Bagi kes pertama, anggapkan teori hentaman tunggal/sasaran tunggal dan bagi kes kedua, anggapkan teori dua hentaman/sasaran tunggal diperlukan bagi kesan maut. Juga lakarkan graf berkenaan bagi setiap kes dengan nilai-nilai yang sesuai. Dapatkan dos ambangnya.

(35 markah)

(d) Berikan komen terhadap kenyataan 2 Gy pada keseluruh badan memberi maut pada manusia tetapi perubahan suhu yang berlaku hanya kecil sahaja.

(15 markah)

JADUAL NILAI RADIOLOGIKAL
Constants, Units, and Conversion Factors

721

TABLE A-1
Constants, Units, and Conversion Factors

1. PHYSICAL CONSTANTS

speed of light	c	2.997925×10^8 m/s
Avogadro's number	N _A	6.022045×10^{23} mol ⁻¹
Planck's constant	h	6.626176×10^{-34} J s
electronic charge	e	1.60218×10^{-19} C
electron mass	m _e	9.109534×10^{-31} kg
proton mass		1.672649×10^{-27} kg
neutron mass		1.674954×10^{-27} kg
average energy deposited in air per liberated charge	W	$33.85 \text{ J/C} = 33.85 \text{ eV/ion pair}$
density of air	ρ	1.293 kg/m^3 at STP (0° C, 101.3 kPa) 1.205 kg/m^3 at NTP (20° C, 101.3 kPa)

2. RADIATION UNITS

a. by definition	b. by implication	based on
becquerel	$1 \text{ Bq} = 1.0 \text{ s}^{-1}$	$1 \text{ R} = 87.33 \times 10^{-4} \text{ J/kg air}$
gray	$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$	$= 54.19 \times 10^{15} \text{ eV/kg air}$
roentgen	$1 \text{ R} = 2.580 \times 10^{-4} \text{ C/kg air}$	
	$3.336 \times 10^{-10} \text{ C/cm}^2 \text{ air at STP}$	

3. ENERGY CONVERSION FACTORS

electron volt	$1 \text{ eV} = 1.602192 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.602192 \times 10^{-12} \text{ erg}$
	$1 \text{ MeV} = 1.602192 \times 10^{-13} \text{ J}$
calorie	$1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$
atomic mass unit	$1 \text{ amu} = 931.481 \text{ MeV}$
electron mass	$m_e = 0.511004 \text{ MeV}$

4. RADIATION CONVERSION FACTORS

rad	$1 \text{ rad} = .01 \text{ Gy} = 100 \text{ erg/g}$
curie	$1 \text{ Ci} = 3.7000 \times 10^{10} \text{ Bq} = 3.7000 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$

5. USEFUL RELATIONS

Coulomb's Law	$F = k q_1 q_2/r^2$, $k = 8.9875 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$
1 esu = 3.336×10^{-10} C	$= 2.082 \times 10^8$ electron charges
Classical radius of electron, $r_0 = \frac{ke^2}{m_e c^2} = 2.81794 \times 10^{-15} \text{ m}$	
Classical Thomson scattering coef., $\sigma_0 = 8 \pi r_0^2/3 = 66.525 \times 10^{-30} \text{ m}^2$	
1 day = 1.44×10^5 min = 8.64×10^4 s; 1 y = 5.260×10^5 min = 3.156×10^7 s	
curie	1 Ci almost equals the activity of 1 g radium
cumulated activity	$1 \text{ mCi hr} = 1.332 \times 10^{11} \text{ Bq s}$ $1 \text{ mCi day} = 3.197 \times 10^{12} \text{ Bq s}$

6. MATHEMATICAL CONSTANTS AND RELATIONS

$$\pi = 3.1416, \quad e = 2.7183, \quad e^{-1} = .3679, \quad e^{-693} = 0.5$$

... 2/-

Compton Coefficients

723

TABLE A-3a - AIR				TABLE A-3b - WATER			
$\rho = 1.205 \text{ kg/m}^3$ (at NTP)				$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$			
$3.006 \times 10^{26} \text{ elct./kg}$				$3.343 \times 10^{26} \text{ elct./kg}$			
Photon energy	Interaction coefficients [cm ² /g]	Average energy	Average stopping power	Photon energy	Interaction coefficients [cm ² /g]	Average energy	Average stopping power
$h\nu$	$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)$ $\left(\frac{\mu_{ab}}{\rho}\right)$	transf. E_{tr}	abs. E_{ab}	$h\nu$	$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)$ $\left(\frac{\mu_{ab}}{\rho}\right)$	transf. E_{tr}	abs. E_{ab}
[keV]		[keV]		[keV]		[keV]	
1	3673.	3672.	1.00	1	4083.	4082.	1.00
1.5	1227.	1226.	1.50	1.5	1395.	1394.	1.50
2	543.7	542.6	2.00	2	627.4	626.4	2.00
3	165.6	164.7	2.98	3	194.7	193.8	2.99
4	78.80	77.28	3.92	4	82.74	81.92	3.96
5	40.29	39.32	4.88	5	42.13	41.46	4.92
6	23.17	22.47	5.82	6	24.13	23.55	5.86
8	9.642	9.168	7.61	8	9.982	9.532	7.64
10	4.910	4.533	9.23	10	5.066	4.684	9.25
15	1.522	1.242	12.2	15	1.568	1.269	12.1
20	.7334	.4942	13.5	20	.7613	.5016	13.2
30	.3398	.1395	12.3	30	.3612	.1411	11.7
40	.2429	.0625	10.3	40	.2629	.0637	9.70
50	.2053	.0389	9.31	50	.2245	.0396	8.82
60	.1861	.0289	9.33	60	.2046	.0305	8.96
80	.1658	.0236	11.4	80	.1833	.0255	11.2
100	.1540	.0231	15.0	100	.1706	.0253	14.8
150	.1356	.0249	27.6	150	.1505	.0276	27.5
200	.1234	.0267	43.4	200	.1370	.0297	43.3
300	.1068	.0287	80.8	300	.1187	.0320	80.8
400	.0955	.0295	124.	400	.1061	.0328	124.
500	.0871	.0297	171.	500	.0969	.0330	171.
550	.0836	.0296	195.	550	.0930	.0329	195.
662	.0771	.0293	252.	662	.0857	.0326	252.
800	.0707	.0288	327.	800	.0787	.0321	327.
[MeV]		[MeV]		[MeV]		[MeV]	
1	.0636	.0279	.440	1	.0707	.0310	.440
1.25	.0569	.0267	.588	.586	2.25	.0632	.0297
1.5	.0518	.0255	.741	.739	2.12	.0575	.0283
2	.0445	.0235	1.06	1.05	1.98	.0494	.0261
3	.0358	.0206	1.74	1.72	1.86	.0397	.0228
4	.0308	.0187	2.46	2.43	1.82	.0340	.0207
5	.0275	.0174	3.22	3.17	1.81	.0303	.0192
6	.0251	.0164	4.00	3.92	1.81	.0276	.0180
8	.0221	.0152	5.64	5.48	1.81	.0242	.0165
10	.0205	.0145	7.37	7.10	1.82	.0222	.0157
15	.0180	.0135	11.9	11.2	1.86	.0193	.0144
20	.0171	.0132	16.4	15.5	1.89	.0182	.0139
30	.0163	.0129	26.3	23.7	1.94	.0171	.0134
40	.0161	.0127	36.1	31.7	1.98	.0167	.0131
50	.0161	.0127	46.1	39.3	2.01	.0167	.0130
60	.0162	.0126	56.1	46.6	2.04	.0167	.0128
80	.0164	.0124	76.0	60.3	2.08	.0169	.0125
100	.0168	.0123	96.1	72.9	2.12	.0172	.0123

* Av. Stopping Power in [MeV cm² g⁻¹] for the spectrum of electrons produced in the medium by photons of energy $h\nu$.

TABLE A.4i RADILOGICAL PROPERTIES OF LEAD

Z=82	$\rho = 11360 \text{ kg/m}^3$	$2.383 \times 10^{26} \text{ elect./kg}$	$A=207.20$		
Photon energy	Basic Coefficients in $(10^{-24} \frac{\text{cm}^2}{\text{atom}})$ or $(10^{-28} \frac{\text{m}^2}{\text{atom}})$	Interaction coef. in [cm^2/g] (To get [m^2/kg] divide by 10)	Av. energy transferred or absorbed	Stopping power S	in $\frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}}$
$h\nu$	σ_{coh} coh. σ_{inc} incoh.	τ photo κ pair	\bar{E}_{tr} $(\frac{\mu}{\rho})$	\bar{E}_{ab} $(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho})$	\bar{S} $(\frac{\mu_{\text{ab}}}{\rho})$
[keV]					
2.48	3686. 4.278	276000.	812.9	802.1	2.45
2.48	3686. 4.280	273600.	2151.	2073.	2.39
2.58	3642. 4.477	663300.	1939.	1870.	2.49
2.58	3646. 4.479	921300.	2688.	2597.	2.50
3.06	3475. 5.385	590700.	1722.	1673.	2.97
3.06	3475. 5.386	793400.	2316.	2247.	2.98
3.55	3280. 6.262	539600.	1578.	1534.	3.45
3.55	3280. 6.263	609000.	1780.	1731.	3.46
3.84	3179. 6.780	494399.	1446.	1408.	3.75
3.85	3179. 6.782	533600.	1560.	1519.	3.75
6	2504. 10.28	167200.	493.3	479.7	5.83
8	2035. 13.20	78790.	235.0	226.8	7.72
10	1686. 15.75	43960.	132.7	126.8	9.55
13	1285. 18.87	21980.	67.68	63.52	12.2
15.2	1095. 20.72	36220.	108.7	80.52	11.3
15.2	1095. 20.72	51139.	151.9	113.5	11.4
15.8	1040. 21.23	45730.	136.0	102.8	12.0
15.8	1039. 21.23	53030.	157.2	119.2	9.39
20	781.5 24.00	28750.	85.91	68.56	16.0
30	455.7 29.69	9745.	29.73	24.93	25.2
50	213.3 33.03	2441.	7.811	6.594	42.2
60	159.2 33.90	1480.	4.863	4.054	50.0
88	83.99 34.49	512.7	1.835	1.444	69.2
88	83.99 34.49	2456.	7.483	2.118	2.096
100	67.57 34.41	1777.	5.461	1.974	1.952
150	32.81 32.90	620.3	1.994	1.075	1.058
200	19.51 31.03	290.5	.9913	.5027	.5902
300	9.230 27.77	100.5	.3996	.2540	.2469
400	5.366 25.22	48.33	.2294	.1419	.1371
500	3.502 23.21	27.93	.1588	.0945	.0909
662	2.038 20.68	14.59	.1084	.0616	.0589
800	1.410 19.06	9.549	.0072	.0485	.0451
[MeV]					[MeV]
1	.9111 17.19	6.028	.0701	.0386	.0364
1.25	.5875 15.40	3.982 .0055	.0581	.0322	.0302
2	.2317 11.98	1.669 1.701	.0453	.0257	.0235
3	.1034 9.437	.8630 3.944	.0417	.0259	.0231
4	.0583 7.878	.5672 5.782	.0415	.0281	.0244
5	.0373 6.305	.4096 7.288	.0423	.0305	.0258
6	.0259 6.016	.3241 8.380	.0429	.0324	.0268
8	.0146 4.922	.2239 10.45	.0454	.0367	.0291
10	.0093 4.193	.1681 12.40	.0488	.0412	.0313
15	.0042 3.103	.1075 15.66	.0549	.0491	.0342
20	.0023 2.491	.0783 18.48	.0612	.0564	.0366
30	.0010 1.814	.0501 22.23	.0700	.0665	.0378
40	.0006 1.441	.0365 24.56	.0757	.0728	.0371
50	.0004 1.203	.0285 26.54	.0807	.0783	.0363
60	.0003 1.037	.0233 27.77	.0838	.0817	.0348
80	.0001 .8176	.0170 29.83	.0891	.0875	.0324
100	.0001 .6796	.0133 31.53	.0937	.0923	.0304

*Av. Stopping Power in $\text{[MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}]$ for the spectrum of electrons produced in the medium by photons of energy $h\nu$

