

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1995/96

Oktober/November 1995

ZSC 310 - Kaedah Matematik III

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TIGA** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua **EMPAT** soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

- 1.(a) Buktikan bahawa  $\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = 0$  jika  $m \neq n$ .

Khiasan: gunakan persamaan pembezaan Legendre yang baginya  $P_m(x)$  dan  $P_n(x)$  adalah penyelesaian, iaitu

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

(35/100)

- (b) Buktikan bahawa  $\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx = \frac{2}{2n+1}$

Khiasan: Gunakan fungsi penjana bagi polinom Legendre, iaitu

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$$

Perhatikan:  $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\left\{x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots\right\}$

(35/100)

- (c) Buktikan bahawa

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} \times P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x)$$

(20/100)

- (d) Diberi  $P_0(x) = 1$ ,  $P_1(x) = x$ , dapatkan (i)  $P_2(x)$  dan (ii)  $P_3(x)$ .

(10/100)

....2

2. Fungsi Bessel ditakrif melalui kembangan siri, iaitu

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)t^n = \exp\left\{\frac{1}{2}x(t - \frac{1}{t})\right\}$$

- (a) Dengan menggunakan takrif ini dapatkan siri untuk  $J_n(x)$ . (25/100)
- (b) Tentukan siri untuk  $J_{-n}(x)$  (25/100)
- (c) Dengan demikian tunjukkan bahawa

$$(-1)^n J_n(x) = J_{-n}(x) \quad (15/100)$$

- (d) Gantikan  $t = e^{i\theta}$  di dalam takrif bagi  $J_n(x)$  di atas dan buktikan bahawa

$$[i] \quad \cos(x \sin \theta) = J_0(x) + 2J_2(x) \cos 2\theta + 2J_4(x) \cos 4\theta + \dots$$

$$[ii] \quad \sin(x \sin \theta) = 2J_1(x) \sin \theta + 2J_3(x) \sin 3\theta + 2J_5(x) \sin 5\theta + \dots$$

(35/100)

Perhatikan:  $\Gamma(n)\Gamma(1-n) = \frac{\pi}{\sin n\pi}$ .

3. Diberi  $J_n(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (x/2)^{n+2r}}{r! \Gamma(n+r+1)}$

$$(a) \quad \text{Buktikan bahawa [i]} \quad J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x,$$

$$[ii] \quad J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$$

$$\text{Perhatikan } \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} \quad (30/100)$$

- (b) Buktikan bagi semua  $n$

$$[i] \quad \frac{d}{dx} \{x^n J_n(x)\} = x^n J_{n-1}(x)$$

$$[ii] \quad \frac{d}{dx} \{x^{-n} J_n(x)\} = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

(30/100)

(c) Buktikan bahawa bagi semua n

$$[i] \quad J'_n(x) = \frac{1}{2} [J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x)]$$

$$[ii] \quad J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$$
(20/100)

(d) Tunjukkan bahawa

$$[i] \quad J_{3/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left( \frac{\sin x - x \cos x}{x} \right)$$

$$[ii] \quad J_{-3/2}(x) = -\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left( \frac{x \sin x + \cos x}{x} \right)$$
(20/100)

4. Seutas tali yang berpanjang  $\ell$  direngangkan diantara dua titik  $(0, 0)$  dan  $(\ell, 0)$  di atas paksi x. Pada masa  $t = 0$  tali ini mempunyai bentuk yang diberi oleh fungsi  $f(x)$ ,  $0 < x < \ell$ , dan ia dilepaskan daripada keadaan rehat. Cari sesaran tali tersebut, iaitu  $y(x, t)$  pada sebarang masa kemudian.

Persamaan gelombang yang memperihalkan getaran tali ini ialah

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} \quad \begin{matrix} t > 0 \\ 0 < x < \ell \end{matrix}$$

di sini  $a$  ialah suatu pemalar.

(100/100)

- oooOooo -

....4

